KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
www.acelity.com

KCI Manufacturing
Unlimited Company
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
www.kci-medical.com

SNAP™ THERAPY SYSTEM

INSTRUCTIONS FOR USE

SNAP™ Therapy Cartridge
SNAP™ Long Dressing Kit
SNAP™ Therapy Strap

ENGLISH

FOAM

SYSTEM DESCRIPTION

The SNAP™ Therapy System includes a mechanically-powered, disposable device for the application of negative pressure and a dressing kit for medical applications.

Not made with natural rubber latex.

SNAP™ THERAPY SYSTEM FEATURES



SNAP™ Therapy Cartridge



INDICATIONS FOR USE

The SNAP™ Therapy System is indicated for patients who would benefit from wound management via the application of negative pressure, particularly as the device may promote wound healing through the removal of excess exudate, infectious material and tissue debris. The SNAP™ Therapy System is indicated for removal of small amounts of exudate from chronic, acute, traumatic, subacute and dehisced wounds, ulcers (such as diabetic, venous or pressure), surgically closed incisions, flaps and grafts.

CONTRAINDICATIONS

Do not place the SNAP™ Therapy System over:

- Inadequately drained wounds
- Necrotic tissue such as eschar or adherent slough
- Exposed blood vessels, anastomotic sites, organs, tendons or nerves
- Wounds containing malignancy
- Fistulas
- Untreated Osteomyelitis
- Actively bleeding wounds

WARNINGS

- It is a condition of use that the device will be operated under the supervision of a qualified clinical caregiver and that the user has the necessary training and knowledge of the specific medical application for which the SNAP™ Therapy System is being used. Failure to follow these conditions and/or to carefully read and follow all of the therapy unit usage and dressing application instructions and the safety information prior to each use may lead to improper device performance and the potential for serious or fatal injury.
- The SNAP™ Therapy System has not been studied on pediatric patients.
- For single patient use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization will compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury or illness.
- Do not use the dressing on patients with allergies to hydrocolloid adhesives or polyurethane films.
- Do not compress contained wound exudate of gelled BIOLOCK™ material when resetting the SNAP™ Therapy Cartridge to prevent expulsion of exudate or BIOLOCK™ material.
- Never leave the SNAP™ Long Dressing in place without active negative pressure therapy unless under clinical supervision. If the red pressure discharge indicator becomes visible, negative pressure is no longer active.
- Complete hemostasis should be achieved prior to use of the system as bleeding may interfere with the normal function of the SNAP™ Therapy System.
- Extra care and monitoring is required for patients who are on anticoagulants or platelet-aggregation inhibitors because bleeding may interfere with the normal function of the SNAP™ Therapy System.
- Infected wounds should be monitored closely and may require more frequent dressing changes. Clinicians and patients / caregivers should frequently mointor the wound, periwound tissue and exudate for sign of infection, worsening infection, or other complications. Some signs of infection are fever, tenderness, redness, swelling, itching, rash, increased warmth in the wound or periwound area, purulent discharge, or strong odor. Infection can be serious, and can lead to complications such as pain, discomfort, fever, gangrene, toxic shock, septic shock, and / or fatal injury. Some signs of systemic infection are nausea, vomiting, diarrhea, headache, dizziness, fainting, sore throat with swelling of the mucus membranes, disorientation, high fever, refractory and / or orthostatic hypotension, or erythroderma (a sunburn like rash). If there are any signs of the onset of systemic infection or advancing infection at the wound site, contact a physician immediately to determine if therapy shoud be discontinued.
- Care should be exercised if using the SNAP™ Therapy System on spinal cord injury patients; stimulus from placement, initiation or cessation of negative pressure may cause autonomic dysreflexia. If a patient utilizing the SNAP™ Therapy System experiences autonomic dysreflexia, discontinue use of the system and seek medical assistance.
- The dressing should be removed prior to defibrillation if near the area of pad/paddle placement.
- Fluid and electrolyte loss may result from highly exudating wounds. Close monitoring of electrolytes may be indicated in such cases.
- Patients with severe malnutrition may be at higher risk for fluid loss from their wounds and may require more frequent monitoring.
- To prevent ischemia, the dressing should not be circumferentially placed around appendages, and the SNAP™-draagband should be worn as loosely as possible.
- Discard if packaging is open or damaged.
- Do not place the dressing materials into blind and unexplored tunnels.
- The primary foam interface should not be in direct contact with delicate structures such as tendons, ligaments and nerves. Use of a wide-mesh non-adherent, bio-engineered tissues or natural tissue structures should be utilized to cover and protect delicate structures.
- During initial placement of the foam interface, count the total number of pieces placed in the wound and document this number per facility protocol.
- During removal of the dressing, ensure that all pieces, as documented during initial placement, and any fragments are removed from the wound. Unintentional dressing material retention for longer time periods than recommended may result in infection or other adverse events.
- For open wounds, it is recommended that the dressing be changed at a minimum of two times per week and the SNAP™ Therapy Cartridge be changed at a minimum of one time per week, with frequency adjusted by the clinician as appropriate. For closed incisions the Dressing can be left in place for continuous use for up to seven days.
- Clinicians, caregivers and patients should frequently monitor the patient's wound, surrounding tissue and secreted exudate for signs of infection or other secondary conditions such as maceration or tissue necrosis. Infection can be severe and result in septic or toxic shock and/or fatal injury.
- The SNAP™ Therapy Cartridge is not safe for use with magnetic resonance imaging (MRI) equipment. Do not use it inside an MRI suite.
- Sharp edges such as bone fragments must be removed from the wound treatment area prior to placing the SNAP™ Long Dressing due to risk of puncturing the Dressing which will impair the proper function of the SNAP™ Therapy System, or could puncture blood vessels or organs resulting in injury.
- Do not place the SNAP™ Therapy System on the vagus nerve to avoid inducing bradycardia.
- Do not place the SNAP™ Therapy System on friable vessels or infected blood vessels. Infected or weakened vessels are more prone to damage, causing bleeding which will interfere with the function of the system.

PRECAUTIONS

- Patient size and weight should be carefully considered when prescribing the SNAP™ Therapy System.
- Care must be taken to position the SNAP™ Therapy Cartridge and dressing tubing appropriately to prevent the risk of tripping and falling.
- To reduce the risk of transmission of blood-borne pathogens, apply standard precautions for infection control with all patients, per institutional protocol.
- The SNAP™ Therapy System may not be appropriate for treatment of noncompliant or combative patients.
- Patients may shower or bathe with the SNAP™ Therapy System. If bathing, do not submerge the SNAP™ Therapy System under water.
- The SNAP™ Therapy Cartridge and Strap are provided non-sterile and should not be sterilized.
- The SNAP™ Therapy Cartridge and Dressing should be stored at room temperature only and should not be exposed to excessive cold or heat.

HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBO)

Do not take the SNAP™ Therapy Cartridge, the SNAP™ Strap or tube fitting into a Hyperbaric Oxygen (HBO) chamber as they have not been studied for use in this environment and could be considered a fire hazard. After disconnecting the dressing tubing from the tube fitting, cover the open end of the dressing tubing with cotton gauze. Alternatively, replace the SNAP™ Dressing with another HBO compatible material during the hyperbaric treatment.

CAUTION: *Do not clamp the tubing during HBO treatment.*

To resume negative pressure therapy after HBO treatment, remove gauze from tubing, cut 5 mm (0.2 in) off tubing end to expose fresh tubing, and reinsert tube fitting. To reset the SNAP™ Therapy Cartridge, refer to the **Resetting the SNAP™ Therapy Cartridge** section.

DISCLAIMER OF WARRANTY AND LIMITATION OF REMEDY

KCI HEREBY DISCLAIMS ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ON THE KCI PRODUCT(S) DESCRIBED IN THIS PUBLICATION. ANY WRITTEN WARRANTY OFFERED BY KCI SHALL BE EXPRESSLY SET FORTH IN THIS PUBLICATION OR INCLUDED WITH THE PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL KCI BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND EXPENSES, INCLUDING DAMAGES OR INJURY TO PERSON OR PROPERTY, DUE IN WHOLE OR IN PART TO THE USE OF THE PRODUCT OTHER THAN THOSE FOR WHICH DISCLAIMER OF WARRANTY OR LIMITATION OF LIABILITY IS EXPRESSLY PROHIBITED BY SPECIFIC, APPLICABLE LAW. NO PERSON HAS THE AUTHORITY TO BIND KCI TO ANY REPRESENTATION OR WARRANTY EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS PARAGRAPH.

Descriptions or specifications in KCI printed matter, including this publication, are meant solely to generally describe the product at the time of manufacture and do not constitute any express warranties except as set forth in the written limited warranty included with this product. Information in this publication may be subject to change at any time. Contact KCI for updates.

PHYSICIAN INSTRUCTIONS

The SNAP™ Therapy Cartridge is available in three models each capable of creating a preset negative pressure level (-75, -100 and -125 mmHg). Prior to placement of the SNAP™ Therapy System, the clinician must assess how to optimally use the system for an individual wound.

It is important to carefully evaluate the wound and patient, to ensure that the Indications For Use are met.

These general guidelines should be adhered to:

- The negative pressure level should never be painful to the patient. If a patient reports discomfort with a certain pressure level, a lower negative pressure SNAP™ Therapy Cartridge should be used until the patient reports comfort with the device.
- If the patient reports discomfort with the -75 mmHg model then therapy with the SNAP™ Therapy System should be discontinued.

The physician instructions to the clinician/ caregiver should contain:

- Negative pressure level to be used
- Dressing change frequency
- Adjunctive dressings to be used
- Patient training and guidance
- Desired treatment duration and/or end-point

Review the label instructions with the patient and/or caregiver and ensure that the patient and/or caregiver understands them adequately.

Ensure the patient and/or caregiver understands the following before release:

- Frequency of SNAP™ Therapy Cartridge Inspection (at a minimum every eight hours).
- Reset the SNAP™ Therapy Cartridge when the red pressure discharge indicator is visible and the SNAP™ Therapy Cartridge is not full.
- Replace the SNAP™ Therapy Cartridge when the red pressure discharge indicator is visible and the SNAP™ Therapy Cartridge is full of exudate / BIOLOCK™ Gel.
- How to replace the SNAP™ Therapy Cartridge. Refer to the **Replacing the SNAP™ Therapy Cartridge** section.
- How to identify a leak in the hydrocolloid and what actions to take to address it. Refer to the **Troubleshooting** section.
- When it is necessary to remove the dressing completely and replace with an alternate dressing. Refer to the **System Application Instructions** section.
- BIOLOCK™ Technology will gel exudate in the SNAP™ Therapy Cartridge.

DRESSING APPLICATION AND SNAP™ THERAPY CARTRIDGE ACTIVATION INSTRUCTIONS

All wounds are unique. The clinician treating the wound needs to make an individual assessment of the optimal dressing and application method.

WARNING: Inspect all packaging before use and do not use products from packages that are open or damaged.

Ensure you have the following dressing items:

- Foam Interface
- SNAP™ Long Dressing
- Wide mesh, non-adherent dressing (if required)

SYSTEM APPLICATION INSTRUCTIONS



1. Prepare the wound bed and periwound skin per institutional protocol and irrigate wound bed thoroughly with normal saline (**Fig. 1**).
2. If necessary for the particular wound, apply a skin protectant to the surrounding skin (**Fig. 2**).
3. For open wounds if necessary for the particular wound, cut a single layer of wide mesh, non-adherent to the size of wound and place on wound bed. For closed incisions place a single layer of wide mesh, non-adherent over length of incision. (**Fig. 3**).
4. Cut the foam interface to fit the size and shape of the wound (**Fig. 4**).

   NOTE: *Do not cut foam directly over wound bed to avoid loose fragments from falling into wound. Brush off foam edges after cutting to remove any loose fragments.*

SYSTEM APPLICATION INSTRUCTIONS (CONT.)

5. Place foam interface into wound cavity (**Fig. 5**). Foam interface should fill the wound cavity and extend above the wound margins. For closed incisions place interface over the incision.

   NOTE: *Count and record the number of pieces used to ensure the same number of pieces are removed during dressing removal. If a piece of foam is used in a tunnel, ensure the foam is in contact with foam in the primary wound bed. Do not place foam into blind or unexplored tunnels.*
6. Place the SNAP™ Long Dressing over the wound and seal (**Fig. 6**). Ensure that the center opening of the Port on the Dressing is placed over the foam interface. Ensure that a minimum of 1 cm of intact skin around the wound is adhered to the dressing to maintain a proper seal.
7. Cut the dressing tubing to the desired length (**Fig. 7**).

   NOTE: *The cut should be straight, not at an angle (**Fig. 8**). This will give a proper seal when connected to the tube fitting.*
8. Fully insert the tube fitting into the tubing (**Fig. 9**).

   CAUTION: *Do NOT remove the cap at the end of the tube fitting.*



9. Connect the SNAP™ Therapy Cartridge to the tube fitting using both hands (**Fig. 10**).
10. To activate the SNAP™ Therapy Cartridge, press down on activation / reset key and pull it out (**Fig. 11**). Re-insert and repeat as needed until an airtight seal is obtained and the red pressure discharge indicator is not visible in the pressure discharge window.
11. Secure the SNAP™ Therapy Cartridge to the patient's extremity or belt using the SNAP™-draagband (**Fig. 12**).

    NOTE: *When the strap is placed around an extremity, take care to ensure that the strap is not placed too tightly as this may cause discomfort or potentially decrease blood flow to the extremity. Distal perfusion may be assessed by noting skin color, altered sensation or pulses.*
12. Check negative pressure operation. The SNAP™ Therapy System is working properly if:
    - Green capacity indicator is both visible and stationary in the chamber window.
    - Dressing has a 'sucked down' appearance.
    - The dressing feels hard to the touch.

Regular visual inspection of the SNAP™ Therapy System is recommended so that any loss in negative pressure delivery can be recognized in a timely manner.

NOTE: At a minimum the SNAP™ Therapy Cartridge should be inspected once every eight hours. *For open wounds dressing changes recommended a minimum of two times per week, with frequency adjusted by the clinician as appropriate. For closed incisions dressing can be left in place for up to 7 days.*

RESETTING THE SNAP™ THERAPY CARTRIDGE

The SNAP™ Therapy Cartridge can be reset as needed according to these instructions as required for clinical use, including resetting after HBO therapy.

If the SNAP™ Therapy Cartridge becomes retracted and the red pressure discharge Indicator becomes visible before an airtight seal is established, reset the SNAP™ Therapy Cartridge using the following steps:



1. Remove the tube fitting from the SNAP™ Therapy Cartridge by pressing the release buttons and pulling the tube fitting out of the SNAP™ Therapy Cartridge (**Fig. 13**). Do not remove the tubing from the tube fitting.
2. Cover the SNAP™ Therapy Cartridge opening with gauze if exudate or gelled BIOLOCK™ Technology material is present in SNAP™ Therapy Cartridge. Always use appropriate personal protective equipment (PPE) when resetting the SNAP™ Therapy Cartridge.
3. Insert the activation / reset key into the slot on the end of the SNAP™ Therapy Cartridge and push the activation / reset key forward into the SNAP™ Therapy Cartridge until the capacity indicator is 5 mL from any exudate or BIOLOCK™ Technology material in the SNAP™ Therapy Cartridge (**Fig. 14**).

WARNING: Do not compress contained wound exudate or gelled BIOLOCK™ material when resetting the SNAP™ Therapy Cartridge to prevent expulsion of exudate or BIOLOCK™ material which should be treated as biomedical waste and disposed of per institutional guidelines.

4. Refer to instructions from Step 9 (**System Application Instructions** section) to reconnet the SNAP™ Therapy Cartridge.

Airtight Seal is present at wound if:

- Green capacity indicator is both visible and stationary in the chamber window.
- Dressing has a sucked down appearance.
- The dressing feels hard to the touch.

If a problem exists after resetting the SNAP™ Therapy Cartridge, refer to the **Troubleshooting** section.

REPLACING THE SNAP™ THERAPY CARTRIDGE

If the red pressure discharge indicator is visible and the SNAP™ Therapy Cartridge is full, the SNAP™ Therapy Cartridge no longer has negative pressure delivery capacity and must be replaced with a new SNAP™ Therapy Cartridge following the steps below if further or continued treatment with the SNAP™ Therapy System is desired or indicated by a physician.



1. Remove the tube fitting from the SNAP™ Therapy Cartridge by pressing the release buttons and pulling the tube fitting out of the SNAP™ Therapy Cartridge (**Fig. 15**).

CAUTION: *Do NOT remove the cap at the end of the tube fitting.*

2. Connect a new SNAP™ Therapy Cartridge to the tube fitting using both hands (**Fig. 16**). An audible click will be heard when the fitting is secured.
3. Activate SNAP™ Therapy Cartridge as described in the **System Application Instructions** section (Step 10). Discard the used SNAP™ Therapy Cartridge according to institutional protocol.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Airtight seal is not present at wound dressing and red pressure discharge indicator **IS** visible OR Green capacity indicator does not remain stationary in chamber window.	• Tubing connections may not be secure. • Leak may be present at hydrocolloid-to-skin interface.	• Check that tubing connections are secure. • Smooth dressing with fingers to flatten wrinkles. • Seal Dressing edges with additional 3M™ Tegaderm™ Dressing. • Apply SNAP™ SecurRing™ Hydrocolloid to dressing edge to seal difficult anatomical locations.
Airtight seal is not present at wound and green capacity indicator is stationary.	• Tubing may be occluded. • Dressing may be occluded.	• Examine tubing for possible occlusion or kinks. If found, straighten tubing or replace SNAP™ Therapy Dressing. • Occlusion may reside in wound dressing. Replace wound dressing.

CLEANING

If the SNAP™ Therapy System becomes soiled, follow the general guidelines below:

- Clean with a damp soft cloth.
- Dry using a dry cloth.
- Avoid using corrosive or abrasive chemicals.

CAUTION: *Do not immerse the SNAP™ Therapy System in fluid.*

EXPLANATION OF SYMBOLS USED

	Consult Instructions For Use		Manufacturer		Date of Manufacture
	Single Use Only		Use By	REF	Catalog number
	Do not use if package is damaged or open		Keep Dry	Do Not Resterilize	Do Not Resterilize
NON STERILE	Non-Sterile	LOT	Lot number	Rx Only	**CAUTION:** Federal (US) law restricts this device to sale/rental by or on the order of a physician
	Single Patient Use	MR	MR Unsafe		
STERILE R	Method of Sterilization - Radiation				
EC REP	Authorized Representative in the European Community				

3M™ Tegaderm™ is a trademarks of 3M™ Corporation. Unless otherwise specifically noted in the text, all other trademarks designated herein are proprietary to KCI Licensing, Inc., its affiliates and / or licensors. Copyright 2018 KCI Licensing, Inc. All rights reserved. 418642 Rev B 9/2018

SNAP™ THERAPIESYSTEM

GEBRAUCHSANWEISUNG

SNAP™ Therapiekartusche
SNAP™ Kit mit Langverband
SNAP™ Therapiegurt

FOAM

DEUTSCH

SYSTEMBESCHREIBUNG

Das SNAP™ Therapiesystem umfasst ein mechanisch betriebenes Einweggerät zur Anwendung von Unterdruck und ein Verbands-Kit für medizinische Anwendungen.

Nicht mit Naturlatex hergestellt.

MERKMALE DES SNAP™ THERAPIESYSTEMS



SNAP™ Therapiekartusche



INDIKATIONEN

Das SNAP™ Therapiesystem ist für Patienten indiziert, die Vorteile aus einer Wundbehandlung durch Anwenden von Unterdruck ziehen würden, besonders da das Gerät die Wundheilung durch Entfernen von überschüssigem Exsudat, infektiösem Material und Geweberesten fördern kann. Das SNAP™ Therapiesystem ist für die Entfernung von kleinen Mengen Exsudats aus chronischen, akuten, traumatischen, subakuten und dehiszenten Wunden, Geschwüren (wie diabetische, venöse oder Druckgeschwüre), chirurgisch verschlossenen Inzisionen, Gewebelappen und Transplantaten indiziert.

KONTRAINDIKATIONEN

Das SNAP™ Therapiesystem nicht mit folgenden Wundarten verwenden:

- Unzureichend drainierte Wunden
- Nekrotisches Gewebe wie Schorf oder anhaftende, abgestorbene Haut
- Freiliegende Blutgefäße, Anastomosenbereiche, Organe, Sehnen oder Nerven
- Wunden mit Malignität
- Fisteln
- Unbehandelte Osteomyelitis
- Aktiv blutende Wunden

WARNHINWEISE

- Es ist Voraussetzung für die Verwendung, dass das Gerät unter der Aufsicht qualifizierten klinischen Pflegepersonals verwendet wird und dass der Benutzer die erforderliche Schulung und das Wissen über die spezifische medizinische Applikation hat, für die das SNAP™ Therapiesystem verwendet wird. Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten und/oder alle Anweisungen für die Anwendung der Therapieeinheit und des Verbands sowie die Sicherheitshinweise nicht vor jeder Verwendung sorgfältig gelesen und befolgt werden, kann dies zu Betriebsstörungen des Geräts und zum Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen führen.
- Das SNAP™ Therapiesystem wurde nicht bei Kindern untersucht.
- Nur zur Verwendung an nur einem Patienten. Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder erneut sterilisieren. Eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation beeinträchtigt die strukturelle Integrität des Geräts und/oder führt zum Versagen des Geräts, was wiederum zu Verletzungen oder zur Erkrankung des Patienten führen kann.
- Den Verband nicht bei Patienten mit Allergien gegen Hydrokolloid-Haftmittel oder Polyurethanfolien anwenden.
- Beim Zurücksetzen der SNAP™ Therapiekartusche nicht das enthaltene Exsudat oder gelierte BIOLOCK™ Material komprimieren, um eine Ausscheidung des Exsudats oder des BIOLOCK™ Materials zu verhindern.
- Den SNAP™ Langverband ohne aktive Unterdrucktherapie nur unter klinischer Überwachung angelegt lassen. Wenn die rote Druckablassanzeige sichtbar wird, besteht kein aktiver Unterdruck mehr.
- Vor der Verwendung des Systems muss eine vollständige Hämostase erreicht werden, da Blutungen die normale Funktion des SNAP™ Therapiesystems stören können.
- Für Patienten, die mit Antikoagulanzien oder Thrombozytenaggregationshemmern behandelt werden, ist besondere Vorsicht und Überwachung erforderlich, da Blutungen die normale Funktion des SNAP™ Therapiesystems stören können.
- Infizierte Wunden sind sorgfältig zu beobachten und erfordern möglicherweise einen häufigeren Verbandswechsel. Ärzte und Patienten/Pflegepersonal sollten die Wunde, das umliegende Gewebe und das Exsudat häufig auf Anzeichen einer Infektion, Verschlimmerung der Infektion oder anderer Komplikationen überwachen. Einige Anzeichen für eine Infektion sind Fieber, Schmerzempfindlichkeit, Rötung, Schwellung, Juckreiz, Ausschlag, verstärkte Wärme im oder um den Wundbereich, eitriger Ausfluss oder starker Geruch. Eine Infektion kann ernsthaft sein und kann zu Komplikationen wie Schmerzen, Unwohlsein, Fieber, Wundbrand, toxischer Schock, septischer Schock und/oder tödliche Verletzungen führen. Einige Anzeichen einer systemischen Infektion sind Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohnmacht, Halsschmerzen mit Schwellung der Schleimhäute, Verwirrung, hohes Fieber, refraktäre und/oder orthostatische Hypotonie oder Erythrodermie (ein sonnenbrandähnlicher Ausschlag). Bei Anzeichen des Einsetzens einer systemischen Infektion oder einer fortschreitenden Infektion im Wundbereich sofort einen Arzt verständigen und abklären lassen, ob die Therapie abgebrochen werden sollte.
- Bei der Anwendung des SNAP™ Therapiesystems bei Patienten mit Rückenmarksverletzungen ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Impulse durch das Anlegen, Einleiten oder Beenden von Unterdruck können zu autonomer Dysreflexie führen. Wenn bei einem Patienten, der das SNAP™ Therapiesystem verwendet, autonome Dysreflexie auftritt, die Verwendung des Systems abbrechen und einen Arzt hinzuziehen.
- Der Verband muss vor einer Defibrillation entfernt werden, wenn er sich in der Nähe der Pads/Paddel befindet.
- Stark nässende Wunden können zu Flüssigkeits- und Elektrolytenverlust führen. In solchen Fällen kann eine sorgfältige Überwachung der Elektrolyten erforderlich sein.
- Für Patienten mit schwerer Unterernährung besteht möglicherweise ein höheres Risiko eines Flüssigkeitsverlusts aus ihren Wunden, und diese erfordern daher möglicherweise eine häufigere Überwachung.
- Um eine Ischämie zu verhindern, darf der Verband nicht zirkulär um Gliedmaßen angelegt werden, und der SNAP™ Therapieverband sollte so lose wie möglich getragen werden.
- Produkt entsorgen, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist.
- Das Verbandmaterial nicht in uneinsehbare und nicht untersuchte Tunnel legen.
- Die Hauptberührungsfläche aus Schaumstoff darf nicht in direktem Kontakt mit empfindlichen Strukturen wie Sehnen, Bändern und Nerven sein. Es sollten grobmaschige, nichthaftende, durch Biotechnik erzeugte Gewebe oder Strukturen aus natürlichem Gewebe zum Abdecken und Schützen empfindlicher Strukturen verwendet werden.
- Während der anfänglichen Platzierung der Schaumstoffberührungsfläche müssen die in die Wunde gelegten Teile gezählt und die Zahl muss gemäß dem Protokoll der Einrichtung dokumentiert werden.
- Beim Entfernen des Verbands ist sicherzustellen, dass alle Teile gemäß der Dokumentation während der anfänglichen Platzierung sowie jegliche Fragmente aus der Wunde entfernt werden. Wenn Verbandmaterial unbeabsichtigt länger als empfohlen an der Wunde gelassen wird, kann dies zu Infektionen oder anderen unerwünschten Ereignissen führen.
- Für offene Wunden wird empfohlen, den Verband mindestens zweimal pro Woche und die SNAP™ Therapiekartusche mindestens einmal pro Woche zu wechseln; diese Häufigkeit wird vom Arzt je nach Bedarf angepasst. Bei geschlossenen Inzisionen kann der Verband für bis zu sieben Tage kontinuierlich in Position gelassen werden.
- Ärzte, Pflegepersonal und Patienten sollten die Wunde des Patienten, das umliegende Gewebe und das abgesonderte Exsudat häufig auf Anzeichen von Infektionen oder andere sekundäre Erkrankungen wie Mazeration oder Gewebenekrose überwachen. Eine Infektion kann schwerwiegend sein und zu septischem oder toxischem Schock und/oder Tod führen.
- Die SNAP™ Therapiekartusche darf nicht in Magnetresonanztomographie-Geräten (MRT) verwendet werden. Nicht in einer MRT-Umgebung verwenden.
- Scharfkantige Gegenstände wie beispielsweise Knochenfragmente müssen aus dem Wundbehandlungsbereich entfernt werden, bevor der SNAP™ Langverband aufgelegt wird, da der Verband ansonsten durchstochen und die ordnungsgemäße Funktion des SNAP™ Therapiesystems beeinträchtigt wird; zudem können auch Blutgefäße oder Organe durchstochen und verletzt werden.
- Das SNAP™ Therapiesystem nicht auf dem Vagusnerv platzieren, um eine Bradykardie zu vermeiden.
- Das SNAP™ Therapiesystem nicht auf brüchigen Gefäßen oder infizierten Blutgefäßen platzieren. Infizierte oder geschwächte Gefäße sind anfälliger für Schäden; hierdurch können Blutungen verursacht werden, die die Funktion des Systems beeinträchtigen.

VORSICHTSHINWEISE

- Beim Verschreiben des SNAP™ Therapiesystems sind Größe und Gewicht des Patienten sorgfältig zu berücksichtigen.
- Es ist auf eine ordnungsgemäße Positionierung der SNAP™ Therapiekartusche und der Schlauchleitung zu achten, um Stolper- und Fallrisiko zu vermeiden.
- Um das Risiko der Übertragung blutgängiger Pathogene zu reduzieren, bei allen Patienten die üblichen Vorkehrungen zur Infektionskontrolle gemäß Institutsrichtlinien treffen.
- Das SNAP™ Therapiesystem ist möglicherweise nicht für die Behandlung nicht kooperationsbereiter oder sich wehrender Patienten geeignet.
- Patienten dürfen mit dem SNAP™ Therapiesystem duschen oder baden. Bei einem Vollbad das SNAP™ Therapiesystem nicht ins Wasser eintauchen.
- SNAP™ Therapiekartusche und Band werden in nicht sterilem Zustand geliefert und dürfen nicht sterilisiert werden.
- SNAP™ Therapiekartusche und Verband dürfen nur bei Raumtemperatur gelagert und nicht übermäßiger Kälte oder Hitze ausgesetzt werden.

HYPERBARE SAUERSTOFFTHERAPIE (HBO)

Die SNAP™ Therapiekartusche, das SNAP™ Band oder den Schlauchanschluss nicht in eine hyperbare (HBO-) Sauerstoffkammer bringen, da diese Geräte nicht für den Einsatz in dieser Umgebung geprüft wurden und ein Brandrisiko darstellen könnten. Nach dem Abnehmen der Schlauchleitung vom Schlauchanschluss das offene Schlauchleitungsende mit Baumwollgaze abdecken. Das SNAP™ Dressing kann während der hyperbaren Sauerstoffbehandlung auch durch ein anderes HBO-kompatibles Material ersetzt werden.

ACHTUNG: *Den Schlauch während der HBO-Behandlung nicht abklemmen.*

Um die Unterducktherapie nach der BHO-Behandlung fortzusetzen, die Gaze vom Schlauch entfernen, 5 mm (0,2 Zoll) vom Schlauchende abschneiden, um ein frisches Schlauchende zu erhalten, und den Schlauch wieder mit dem Anschlussstück verbinden. Informationen zum Zurücksetzen der SNAP™ Therapiekartusche sind im Abschnitt **Zurücksetzen der SNAP™ Therapiekartusche** zu finden.

HAFTUNGSAUSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

KCI LEHNT HIERMIT FÜR DAS/DIE IN DIESER PUBLIKATION BESCHRIEBENE(N) KCI-PRODUKT(E) JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG AB, Z. B. STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. JEDE VON KCI SCHRIFTLICH ZUGESICHERTE GEWÄHRLEISTUNG MUSS IN DIESER PUBLIKATION AUSDRÜCKLICH VERMERKT SEIN ODER DEM PRODUKT IN SCHRIFTLICHER FORM BEILIEGEN. KCI HAFTET KEINESFALLS FÜR INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN UND -KOSTEN, Z. B. PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE GANZ ODER TEILWEISE AUF DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ZURÜCKZUFÜHREN SIND, AUSSER FÜR SCHÄDEN, FÜR DIE NACH SPEZIELLEM, GELTENDEM RECHT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS BZW. EINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT IST. NIEMAND IST BERECHTIGT, KCI AN EINE ZUSICHERUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG ZU BINDEN, SOWEIT DIES NICHT AUSDRÜCKLICH IN DIESEM PARAGRAPHEN FESTGELEGT IST.

Beschreibungen oder Spezifikationen in Druckerzeugnissen von KCI, u. a. in diesem Dokument, sollen ausschließlich als allgemeine Beschreibung des Produkts zum Herstellungszeitpunkt dienen und stellen keine ausdrückliche Gewährleistung dar, soweit dies nicht in der schriftlichen eingeschränkten Gewährleistung festgelegt ist, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten ist. Informationen in diesem Dokument können jederzeit geändert werden. Für Aktualisierungen KCI kontaktieren.

ANWEISUNGEN FÜR DEN ARZT

Die SNAP™ Therapiekartusche ist in drei Modellen erhältlich, die jeweils eine voreingestellte Druckstufe des Unterdrucks (-75, -100 und -125 mmHg) erzeugen können. Vor dem Anbringen des SNAP™ Therapiesystems muss der Arzt beurteilen, wie das System für eine individuelle Wunde optimal einzusetzen ist.

Es ist wichtig, dass die Wunde und der Patient sorgfältig beurteilt werden, um sicherzustellen, dass die Indikationen für den Gebrauch erfüllt sind.

Es sind folgende allgemeine Richtlinien zu befolgen:

- Die Druckstufe des Unterdrucks darf für den Patienten niemals schmerzhaft sein. Wenn ein Patient bei einer bestimmten Druckstärke Beschwerden meldet, sollte eine SNAP™ Therapiekartusche mit einem geringeren Unterdruck verwendet werden, bis der Patient meldet, dass das Gerät komfortabel ist.
- Wenn der Patient über Beschwerden mit dem Modell mit -75 mmHg klagt, sollte die Therapie mit dem SNAP™ Therapiesystem abgebrochen werden.

Die Anweisungen für den Arzt/das Pflegepersonal müssen Folgendes enthalten:

- Die zu verwendende Druckstufe des Unterdrucks
- Die Häufigkeit des Verbandwechsels
- Zu verwendende zusätzliche Verbände
- Patientenunterweisung und -anleitung
- Gewünschte Behandlungsdauer und/oder Endpunkt der Behandlung

Die Anweisungen auf dem Etikett zusammen mit dem Patienten und/oder dem Pflegepersonal durchgehen und sicherstellen, dass der Patient und/oder das Pflegepersonal diese ausreichend versteht.

Vor der Entlassung sicherstellen, dass der Patient und/oder das Pflegepersonal Folgendes versteht:

- Häufigkeit der Überprüfung der SNAP™ Therapiekartusche (mindestens alle acht Stunden).
- Zurücksetzen der SNAP™ Therapiekartusche, wenn die rote Druckablassanzeige sichtbar und die SNAP™ Therapiekartusche nicht voll ist.

DRESSINGANWENDUNG UND AKTIVIERUNGSANWEISUNGEN FÜR DIE SNAP™ THERAPIEKARTUSCHE

Jede Wunde ist einzigartig. Der

SYSTÈME DE THÉRAPIE SNAP™
NOTICE D'INSTRUCTION
Cartouche de thérapie SNAP™
Kit de pansement long SNAP™
Sangle de thérapie SNAP™

FOAM
FRANÇAIS

DESCRIPTION DU SYSTÈME
Le système de thérapie SNAP™ inclut un dispositif jetable à commande mécanique conçu pour le traitement des plaies par pression négative et un kit de pansement pour applications médicales.
Exempt de latex de caoutchouc naturel.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE THÉRAPIE SNAP™


Kit de pansement long SNAP™



MODE D'EMPLOI
Le système de thérapie SNAP™ est indiqué chez les patients pour lesquels une thérapie par pression négative serait bénéfique dans la mesure où ce dispositif peut notamment favoriser la cicatrisation grâce au drainage de l'excès de plasma, d'éléments infectieux et de débris tissulaires. Le système de thérapie SNAP™ est indiqué pour le drainage de petites quantités d'exsudats présentes dans des plaies chroniques, aiguës, traumatiques, subaiguës et déhiscentes, des ulcères (tels que les ulcères diabétiques, veineux ou plaies de pression), des incisions chirurgicales fermées, des lambeaux et des greffes.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION DU SYSTÈME (SUITE)

5. Placer l'interface en mousse dans la cavité de la plaie (**Fig. 5**). L'interface en mousse doit remplir la cavité de la plaie, en prolongeant au-delà des marges de la plaie. Pour les incisions fermées, placer l'interface au dessus de l'incision.
REMARQUE : *Compter et enregistrer le nombre de pièces utilisées pour s'assurer que le même nombre soit retiré lors du retrait du pansement. Si un morceau de mousse est laissé dans une tunnellisation, s'assurer que la mousse est en contact avec celle du fit dernier principal. Ne pas introduire de mousse dans des tunnellisations longues ou non explorées.*
6. Placer le pansement long SNAP™ sur la plaie et le surface. (**Fig. 6**). S'assurer que l'ouverture centrale de l'orifice sur le pansement est placée au-dessus de l'interface en mousse. S'assurer qu'au moins 1 cm de peau intacte autour de la plaie adhère au pansement pour garantir une étanchéité optimale.
7. Couper la tubulure du pansement à la longueur désirée (**Fig. 7**).
REMARQUE : *La coupure doit être droite et non à un angle (**Fig. 8**). Ceci permettra d'assurer une étanchéité optimale lors de la connexion au raccord du tube.*
8. Introduire complètement le raccord du tube dans la tubulure (**Fig. 9**).
ATTENTION : *Ne PAS retirer le capuchon à l'extrémité du raccord de tube.*

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas placer le système de thérapie SNAP™ sur :
- des plaies inconnectement drainées ;
- des tissus nécrotiques comme des escarres ou de la fibrine adhérente ;
- des vaisseaux sanguins, sites anastomotiques, organes, tendons ou nerfs exposés ;
- des plaies présentant une malignité ;
- des fistules ;
- une ostéomyélite non traitée ;
- des plaies avec saignements actifs.

MISES EN GARDE
- Pour être utilisé, le dispositif doit être manipulé sous la supervision d'un clinicien qualifié, et l'utilisateur doit disposer de la formation et des connaissances nécessaires sur l'application médicale spécifique pour laquelle le système de thérapie SNAP™ est destiné. Il est nécessaire de considérer les conditions et d'un tout manquement aux recommandations être attentivement et respecter toutes les instructions et consignes de sécurité contenues dans l'utilisation de l'unité de thérapie et l'application des pansements avant chaque utilisation) peut provoquer des dysfonctionnements du système et des blessures graves, voire mortelles.
- Le système de thérapie SNAP™ n'a pas été étudié sur des patients pédiatriques.
- Ne peut être utilisé que sur un seul patient. Ne pas réutiliser, reconditionner ni restériliser. Une réutilisation, un reconditionnement ou une restérilisation comprométra l'intégrité structurelle du dispositif et / ou provoquera une panne du dispositif qui, à son tour, peut engendrer une blessure ou une maladie du patient.
- Ne pas utiliser le pansement sur des patients souffrant d'allergies aux adhésifs hydrocolloïdes ou aux matériaux contenant du latex.
- Ne pas comprimer les exsudats ou le matériau BIOLOCK™ gélifié contenus de la plaie lors de la réinitialisation ou lors de la vérification du système. Ne pas comprimer l'éponge ou le matériau BIOLOCK™.
- Ne jamais laisser le pansement long SNAP™ en place sans une thérapie par pression négative active, excepté sous la supervision d'un clinicien. Si le témoin rouge de décharge de la pression est visible, la pression négative n'est plus active.
- Une hémostase complète doit être atteinte avant d'utiliser le système car l'hémorragie peut empêcher le bon fonctionnement du système de thérapie SNAP™.
- Des soins et un suivi appropriés des plaies infectées et fortement suspectées sont nécessaires pour éviter la prolifération bactérienne et l'infection sous le pansement, y compris une septicémie.
- Les plaies infectées requièrent une surveillance étroite et peuvent nécessiter des changements de pansement plus fréquents. Les cliniciens et les patients / le personnel soignant doivent surveiller régulièrement la plaie. Ne pas prolonger l'utilisation au-delà de détecter tout signe d'infection, d'aggravation d'une infection ou d'autres complications. Une infection peut se manifester par les symptômes suivants : douleur, sensibilité, rougeur, chaleur, gonflement, écoulement purulent, éruption, sensation de chaleur dans la plaie ou dans la région périphérique, écoulement purulent ou odeur provenant de la plaie ou de la région périphérique. Les symptômes généraux peuvent inclure la sensation de grippe, fièvre, gangrène, choc toxique, choc septique et / ou blessures mortelles. Les symptômes d'une infection systémique sont les suivants : nausées, vomissements, diarrhées, céphalées, vertiges, étourdissements, maux de gorge avec gonflement, décoloration de la peau, éruption cutanée, érythème rhumatoïde ressemblant à un coup de soleil et / ou hypotension réfractaire ou orthostatique. Si des signes de début d'infection apparaissent, le système d'infection doit être retiré et une thérapie appropriée, appeler immédiatement un médecin pour déterminer s'il faut interrompre ou non la thérapie.
- Faire preuve de prudence si le système de thérapie SNAP™ est utilisé sur des patients ayant subi des lésions de la moelle épinière ; un stimulus dû au positionnement, au déclenchement ou à l'interruption de la pression négative peut provoquer une dysréflexie autonome. Lorsque le système de thérapie SNAP™ présente une dysréflexie autonome, cesser toute utilisation du système et consulter un médecin.
- Le pansement SNAP™ ne doit pas être utilisé avec une électrothérapie. Retirer le pansement avant le positionnement de la pastille / plaquette.
- Une perte de liquide et d'électrolyte peut résulter de plaies très exsudatives. Une surveillance étroite des électrolytes peut alors être indiquée.
- Les patients souffrant de grave malnutrition peuvent présenter des essues plus élevés de perte de liquide et d'électrolyte. Ils doivent faire l'objet d'une surveillance plus fréquente.
- Pour prévenir l'ischémie, le pansement ne doit pas être appliqué de manière circonférentielle autour des extrémités ou autour du tronc. Ne pas trop étirer le pansement SNAP™ lors de son application.
- Jeter si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Ne pas implanter le système de thérapie SNAP™ dans des tunnellisations fermées et non explorés.
- L'interface en mousse principale ne doit pas entrer en contact direct avec des structures délicates, comme les tendons, les ligaments, les nerfs ou les vaisseaux sanguins. Une couche protectrice doit être adhérents à fibrer large ou de structures en tissu naturel doit être privilégiée pour recouvrir et protéger ces structures délicates.
- Lors de la mise en place de l'interface en mousse, compter le nombre total de pièces placées dans la plaie et documenter ce nombre conformément aux procédures standard de l'établissement.
- Lors du retrait du pansement, s'assurer que toutes les pièces, telles que documentées lors de la mise en place initiale, ont été retirées. Ne pas laisser de pièces de mousse dans la plaie. Si une pièce semble manquer, ne pas tenter de la retirer. Surveiller la plaie et consulter un médecin si nécessaire.
- Ne pas utiliser le pansement SNAP™ avec des produits contenant de l'huile ou de l'alcool.
- Afin de réduire le risque de transmission d'agents pathogènes véhiculés par le sang, il convient de manipuler le système de thérapie SNAP™ conformément aux politiques de l'établissement en matière de gestion, conditionnement et élimination des déchets infectieux.
- Le système de thérapie SNAP™ peut être inadapté au traitement de patients non conformes ou résistants.
- Les patients peuvent prendre une douche ou un bain avec le système de thérapie SNAP™. En cas de baignade ou de natation, un pansement étanche à l'eau doit être utilisé.
- La cartouche et la sangle de thérapie SNAP™ sont livrées non stériles et ne doivent pas être stérilisées.
- La cartouche et le pansement de thérapie SNAP™ doivent être conservés à une température ambiante uniquement et ne doivent pas être exposés à une chaleur ou un froid excessif.

RÉINITIALISATION DE LA CARTOUCHE DE THÉRAPIE SNAP™
La cartouche de thérapie SNAP™ peut être réinitialisée si nécessaire conformément à ses instructions selon les besoins pour l'utilisation clinique, notamment la réinitialisation après une thérapie OFF.
Si la cartouche de thérapie SNAP™ est retirée de la tubulure du pansement, le témoin rouge de décharge de la pression est visible avant qu'un ensemble étanche ne soit établi, réinitialiser la cartouche de thérapie SNAP™ en procédant comme suit :

1. Retirer le raccord de tube de la cartouche de thérapie SNAP™ en appuyant sur les boutons de dévernouillage et en extrayant le raccord de tube de la cartouche de thérapie SNAP™ (**Fig. 13**). Ne pas retirer la tubulure du raccord de tube.
2. Recouvrir l'ouverture de la cartouche de thérapie SNAP™ avec une compresse s'le dissolvant ou du matériau BIOLOCK™. Utiliser systématiquement un équipement de protection individuel (EPI) approprié lors de la réinitialisation de la cartouche de thérapie SNAP™.
3. Introduire à clé d'activation / de réinitialisation dans la fente à l'extrémité de la cartouche de thérapie SNAP™ et l'enfoncer dans la cartouche de thérapie SNAP™ jusqu'à ce que le témoin de capacité indique 5 ml, d'un exsudat ou matériau de technologie BIOLOCK™ dans la cartouche de thérapie SNAP™ (**Fig. 14**).

MISE EN GARDE : Ne pas comprimer les exsudats ou le matériau BIOLOCK™ gélifié contenus de la plaie lors de la réinitialisation de la cartouche de thérapie SNAP™ pour éviter toute expulsion d'exsudat ou de matériau BIOLOCK™ qui doivent être traités comme des déchets biomédicaux et mis au rebut conformément aux recommandations de l'établissement.

4. Se reporter aux instructions de l'étape 9 (section **Instructions d'application du système**) pour reconnecter la cartouche de thérapie SNAP™.

L'étanchéité de la plaie est garantie si :
- le témoin de capacité vert est visible et flue dans la fenêtre de la chambre ;
- le pansement présente un aspect ridé ;
- le pansement est plat au toucher.

Si un problème se produit après avoir réinitialisé la cartouche de thérapie SNAP™, se reporter à la section **Dépannage**.

OXYGÉNOTHÉRAPIE HYPERBARE (OHB)
Ne pas insérer la cartouche de thérapie SNAP™ ni la sangle SNAP™ ou le raccord de tube dans un caisson d'oxygénothérapie hyperbare (OHB) car ils n'ont pas été étudiés pour être utilisés dans cet environnement et peuvent présenter un risque d'incendie. Retirer le pansement SNAP™ avant le traitement par OHB. Le pansement SNAP™ doit être retiré et remplacé par un autre pansement compatible OHB pendant le traitement hyperbare.

ATTENTION : *Ne pas fixer la tubulure pendant le traitement par OHB.*

Pour représenter la thérapie par pression négative après traitement par OHB, retirer la compresse de la tubulure, couper 5 mm (0,2 po) de l'extrémité de la tubulure pour exposer la tubulure revue et reprendre la thérapie en procédant comme indiqué dans la section « Changement de la cartouche de thérapie SNAP™ » se reporter à la section **Réinitialisation de la cartouche de thérapie SNAP™**.

EXONÉRATION DE GARANTIE ET LIMITES DES RECOURS
SAUF EN LA PRÉSENCE D'ACCORD SPÉCIFIQUE ÉCRIT DE KCI, LE DISPOSITIF, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, EST VENDU « TEL QUEL » ET PROCURÉ EXCLUSIVEMENT DANS CE CADRE. TOUTES GARANTIES ÉCRITE OPPERTE PAR KCI DONT EXPRESSÉMENT STIPULÉE DANS CE DOCUMENT OU INCLUSE AVEC LE DISPOSITIF, EST EXCLUE. KCI NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS OU DE BLESSURES DE TIERS, RÉSULTANT EN PARTIE OU EN TOTALITÉ DE L'UTILISATION OU PRODUIT, AUTRES QUE POUR LES MONTANTS LÉGALEMENT EXIGÉS DE CEUX-CI. LA RESPONSABILITÉ DE KCI EST EXPRESSÉMENT INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE EN VIGUEUR, NUL N'EST HABILITÉ À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE KCI EN VERTU D'UNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE QUELCONQUE, SAUF STIPULATION EXPRESSE DE LE PRÉSENT PARAGRAPHE.

Les dispositifs et produits pharmaceutiques figurant dans la documentation écrite de KCI, y compris à présente publication, sont vendus exclusivement à des fins d'utilisation par un professionnel de la fabrication et ne constituent nullement une garantie expresse, sauf stipulation dans la garantie limitée écrite incluse avec ce produit. Les informations figurant dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment. Contactez KCI pour connaître les mises à jour éventuelles.

INSTRUCTIONS DU MÉDECIN
La cartouche de thérapie SNAP™ est disponible en trois modèles, chacun capable de créer un niveau de pression négative préétre (-75, -100 et -125 mmHg). Avant le positionnement du système de thérapie SNAP™, le clinicien doit déterminer le niveau de pression négative approprié pour le système pour une plaie.

Il convient d'évaluer soigneusement la plaie et le patient afin de s'assurer que le mode d'emploi est respecté. Les recommandations générales doivent être respectées :

- Le niveau de pression négative ne doit jamais être douloureux pour le patient. Si un patient se plaint d'une gêne ou d'une douleur, il convient de réduire le niveau de pression ou de choisir un niveau négative inférieure doit être utilisée jusqu'à ce que le patient indique un niveau de confort optimal.
- Si le patient fait état d'une gêne avec le mode de -75 mmHg, la thérapie avec le système de thérapie SNAP™ ne doit pas être utilisée.

Les instructions du médecin destinées au clinicien / personnel soignant doivent indiquer :

- Le niveau de pression négative à utiliser
- La fréquence de changement de pansement
- Les pansements complémentaires à utiliser
- Les formation et des instructions spécifiques à destiner au patient
- La durée et / ou le point de terminaison de traitement souhaités

Examiner les instructions figurant sur la tubulure du pansement avec le client et / ou le personnel soignant et s'assurer que ces derniers les comprennent parfaitement.

S'assurer que le patient et / ou le personnel soignant comprennent ce qui suit avant la publication :

- Fréquence de vérification de la cartouche de thérapie SNAP™ (au moins une fois toutes les huit heures).
- Réinitialiser la cartouche de thérapie SNAP™ lorsque le témoin rouge de décharge de la pression est visible et que la cartouche de thérapie SNAP™ n'est pas pleine.
- Remplacer la cartouche de thérapie SNAP™ lorsque le témoin rouge de décharge de la pression est visible et que la cartouche de thérapie SNAP™ est remplie d'exsudat / de gel BIOLOCK™.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE THÉRAPIE SNAP™
Si le témoin rouge de décharge de la pression est visible et que la cartouche de thérapie SNAP™ est pleine, la cartouche de thérapie SNAP™ ne dispose plus d'une capacité d'application de pression négative et doit être remplacée. Si le témoin rouge de décharge de la pression est visible et que la cartouche n'est pas pleine, le traitement utilisera du continu avec le système de thérapie SNAP™ est souhaité ou indiqué par un médecin.



1. Retirer le raccord de tube de la cartouche de thérapie SNAP™ en appuyant sur les boutons de dévernouillage et en extrayant le raccord de tube de la cartouche de thérapie SNAP™ (**Fig. 15**).

ATTENTION : *Ne PAS retirer le capuchon à l'extrémité du raccord de tube.*

2. Connecter une cartouche de thérapie SNAP™ neuve au raccord de tube avec les deux mains (**Fig. 16**). Un déclic se fait entendre lorsque le raccord est fixé.
3. Activer la cartouche de thérapie SNAP™ comme décrit à la section **Instructions d'application du système** (étape 10). Jeter la cartouche de thérapie SNAP™ usée conformément au protocole hospitalier.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution possible
Le pansement pour plaie n'est pas totalement étanche et le témoin rouge de décharge de la pression **EST** visible OU Le témoin de capacité vert ne voie pas flue dans la fenêtre de la chambre.	• Les raccordements de la tubulure ne sont peut-être pas totalement étanches. • L'interface hydrocellulaire peu perforée peut être une fuite.	• Vérifier que les raccordements de la tubulure ont été correctement effectués. Lisser le pansement avec les doigts pour éliminer les plis. Si nécessaire, retirer le pansement avec le pansement 3M™ Tegaderm™ supplémentaire. • Appliquer SNAP™ securifilm™ hydrocolloïdal sur le bord du pansement pour sceller les zones anatomiques difficiles.
Le pansement n'est pas totalement étanche au niveau de la plaie et le témoin de capacité vert est fixe.	• La tubulure est peut-être obstruée. • Le pansement est peut-être obstrué.	• Examiner la tubulure afin de détecter une éventuelle occlusion ou torsion. S'une occlusion ou torsion est détectée, redémarrer la tubulure ou remplacer le pansement de thérapie SNAP™. • Le pansement pansé pansé pansé le pansement pansé pansé pansé le pansement pour plaie.

- Mode de remplacement de la cartouche de thérapie SNAP™ Se reporter à la section **Remplacement de la cartouche de thérapie SNAP™**
- Mode d'identification d'une fuite dans l'hydrocolloïdale et mesures à prendre pour colmater cette dernière. Se reporter à la section **Dépannage**.
- Cas dans lequels un retrait total du pansement et un remplacement par un autre pansement peuvent s'avérer nécessaires. Se reporter à la section **Instructions d'application du système**.
- La technologie BIOLOCK™ gélifie les exsudats dans la cartouche de thérapie SNAP™.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION DU PANSEMENT ET D'ACTIVATION DE LA CARTOUCHE DE THÉRAPIE SNAP™
Toutes les plaies sont uniques. Le clinicien qui traite la plaie doit procéder à une évaluation individuelle du pansement et du mode d'application optimaux.
MISE EN GARDE : Inspecter tous les emballages avant utilisation et ne pas utiliser les produits en cas d'emballages qui sont ouverts ou défectueux.
Veiller à disposer des éléments de pansement suivants :

- Interface en mousse
- Pansement long SNAP™
- Pansement non adhérent à large filet (si nécessaire)

INSTRUCTIONS D'APPLICATION DU SYSTÈME

1. Préparer le lit de la plaie et la peau périlésionnelle conformément au protocole hospitalier et intriguer soigneusement le lit avec une solution saline normale (**Fig. 1**).
2. Si nécessaire pour la plaie sèche, appliquer un produit de protection cutanée sur la peau environnante (**Fig. 2**).
3. Pour les plaies ouvertes, si nécessaire pour la plaie spécifique, couper une courbe simple de filet large non adhérent, adapter à la taille de la plaie et la placer sur le lit de la plaie. Pour les incisions fermées, placer une couche sèche de filet large, non adhérent, sur toute la longueur de l'incision (**Fig. 3**).
4. Couper l'interface en mousse afin qu'elle corresponde à la taille et à la forme de la plaie (**Fig. 4**).
REMARQUE : *Ne pas couper la mousse directement au-dessus du lit de la plaie pour éviter que des fragments adhèrent au lit. Tamponner sur la plaie. Brosser les bords en mousse après la coupe pour éliminer tous les fragments détachés.*

NETTOYAGE
Si le système de thérapie SNAP™ est souillé, suivez les recommandations générales ci-dessous :
- Nettoyer le système avec un chiffon doux humide.
- Le séchez avec un chiffon sec.
- Éviter d'utiliser des produits chimiques corrosifs ou abrasifs.

ATTENTION : *Ne pas immerger le système de thérapie SNAP™ dans des liquides.*

EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISÉS

	Consulter la notice d'instruction	Fabricant	Date de fabrication
	Usage unique	Date limite d'utilisation	Référence
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Protéger de l'humidité	Ne pas réutiliser une seconde fois
	Non stérile	Numéro du lot	**Rx Only** — **ATTENTION :** la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être délivré que sur prescription d'un médecin
	Utilisation sur un seul patient	Non prostégé contre le champ magnétique de la IRM	
	Méthode de stérilisation : Rayonnement		
	Mandataire européen		

3M™ Tegaderm™ est une marque commerciale de la société 3M™. Sauf indication contraire spécifique dans le texte, toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont propriété de KCI Licensing Inc. et de ses filiales et / ou de ses concédants de licence.
Copyright 2018 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. 418642 Rev B 9/2018

SISTEMA TERAPEUTICO SNAP™
ISTRUZIONI PER L'USO
Cartuccia per terapia SNAP™
Kit di medicazione lunga SNAP™
Fascetta per terapia SNAP™

FOAM
ITALIANO

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Il sistema terapeutico SNAP™ include un dispositivo monouso azionato meccanicamente per l'applicazione di pressione negativa e un kit di medicazione per le applicazioni mediche.
Non realizzato con lattice di gomma naturale.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERAPEUTICO SNAP™

Kit di medicazione lunga SNAP™

INDICAZIONI PER L'USO
Il sistema terapeutico SNAP™ è indicato per i pazienti che trarrebbero beneficio da una gestione della ferita tramite l'applicazione di pressione negativa, in particolare poiché il dispositivo può favorire la guarigione tramite la rimozione di materiale infetto, tessuto fluido e tessuto necrotico in eccesso. Il sistema terapeutico SNAP™ è indicato per la rimozione di piccole quantità di essudato da ferite croniche, acute, traumatiche, subacute e deiscenti, ulcere (ad esempio diabetiche, venose o da pressione), incisioni, lembi e innesti chiusi chirurgicamente.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA (CONTINUA)

5. Posizionare l'interfaccia in schiuma nella cavità della ferita (**Fig. 5**). L'interfaccia in schiuma deve riempire la cavità della ferita ed estendersi oltre i margini della ferita. Per le incisioni chiuse, posizionare l'interfaccia sull'incisione.
NOTA: *Contare e prendere nota del numero di pezzi usati per assicurarsi che la stessa quantità venga poi eliminata durante la rimozione della medicazione. Se un pezzo di schiuma viene usato in un tunnel, assicurarsi che la schiuma si trovi a contatto con la schiuma nel letto della ferita primaria. Non posizionare la schiuma in tunnel ciechi o inesplorati.*
6. Posizionare la medicazione lunga SNAP™ sulla ferita e sigillare (**Fig. 6**). Assicurarsi che l'apertura centrale della porta sulla medicazione sia posizionata sopra l'interfaccia in schiuma. Assicurarsi che almeno alla ferita vi sia almeno 1 cm di cute integra su cui è applicata la medicazione al fine di mantenere una tenuta adeguata.
7. Tagliare il tubo della medicazione alla lunghezza desiderata (**Fig. 7**).
NOTA: *Il taglio deve essere dritto, non ad angolo (**Fig. 8**). In questo modo sarà possibile ottenere una tenuta adeguata con il raccordo del tubo.*
8. Inserire completamente il raccordo nel tubo (**Fig. 9**).
ATTENZIONE: *NON rimuovere il cappuccio posto sull'estremità del raccordo del tubo.*

CONTROINDICAZIONI
Non collocare il sistema terapeutico SNAP™ su:
- Ferite non trattate di origine non nota
- Tessuto necrotico, come escara o tessuto necrotico aderente
- Vasi sanguigni esposti, siti anastomotici, organi, tendini o nervi
- Fistule non trattate
- Fistole
- Osteomielite non trattata
- Ferite con sanguinamento attivo

AVVERTENZE
- Il suo corretto uso per l'utilizzo che il dispositivo venga utilizzato dietro la supervisione di un operatore clinico qualificato e che l'utente abbia seguito la formazione e abbia le conoscenze necessarie sull'applicazione medica specifica per la quale il sistema terapeutico SNAP™ viene utilizzato. Il mancato rispetto di queste condizioni e/o la non lettura attenta e il non rispetto di tutte le istruzioni per l'utilizzo dell'unità terapeutica e l'applicazione delle medicazioni prima di ogni utilizzo possono determinare prestazioni inadeguate del dispositivo e il rischio di lesioni gravi o letali.
- Non è stato studiato l'utilizzo del sistema terapeutico SNAP™ su pazienti pediatrici.
- Per l'uso su un solo paziente. Non riutilizzare, rifabbricare o risterilizzare. Il riutilizzo, la rifabbricazione o la risterilizzazione compromettono l'integrità strutturale del dispositivo e/o non compromettono le prestazioni, con conseguenti possibili lesioni o malattia del paziente.
- Non utilizzare la medicazione su pazienti con allergie ad adesivi idrocolloidali o pellicole in poliuretano.
- Non comprimere l'essudato della ferita di materiale BIOLOCK™ in gel quando si resetta la cartuccia per terapia SNAP™ per evitare l'espulsione di essudato o materiale BIOLOCK™.
- Non lasciare la medicazione lunga SNAP™ in situ senza terapia a pressione negativa attiva a meno che non sia presente un medico. Se l'indicatore di mandata della pressione rosso diventa visibile, la pressione negativa non è più attiva.
- Raggiungere l'emostasi completa prima di utilizzare il sistema, poiché il sanguinamento può interferire con il normale funzionamento del sistema terapeutico SNAP™.
- Occorre la massima attenzione e un attento monitoraggio dei pazienti che assumono anticoagulanti o inibitori dell'aggregazione piastrinica, poiché il sanguinamento può interferire con il normale funzionamento del sistema terapeutico SNAP™.
- Le ferite infette devono essere monitorate con attenzione e potrebbero richiedere un cambio della medicazione più frequente. Medici e pazienti/operatori sanitari devono controllare di frequente la ferita. Il tessuto potenzialmente infetto deve essere rimosso prima di continuare con l'applicazione o altre complicanze. Alcuni segni di infezione sono febbre, dolore alla palpazione, rossore, gonfiore, pruriti, eruzione cutanea, aumento della temperatura nella ferita o nell'area periferica, secrezione purulenta o odore intenso. L'infezione può essere grave e portare a complicanze quali dolore, malessere, febbre, gangrena, shock tossico, shock settico o lesioni mortali. Alcuni segni di infezione sistemica sono nausea, vomito, diarrea, cefalea, vertigini, svenimenti, tamponi per gonfiore delle mucose, disorientamento, febbre alta, ipotensione refrattaria e/o ortostatica ed eritrodermia (eruzione cutanea simile a quella da ustione solare). In presenza di segni di inizio infezione, la cartuccia di un'infezione deve essere rimossa e un appropriato dell'infezione nel sito della ferita, contattare immediatamente un medico per valutare la necessità di interrompere la terapia.
- Prestare attenzione se si utilizza il sistema terapeutico SNAP™ su pazienti con lesione spinale; lo stimolo legato al posizionamento, all'avvio o alla cessazione della pressione negativa può causare iper-riflessia simpatica. Se un paziente che utilizza il sistema terapeutico SNAP™ manifesta iper-riflessia simpatica, interrompere l'utilizzo del sistema e richiedere l'intervento di un medico.
- Rimuovere la medicazione prima di eseguire la defibrillazione se ci si trova in prossimità dell'area di posizionamento della piastra/elettrodo.
- Le ferite con essudato eccessivo possono portare a perdita di fluidi ed elettroliti. In questi casi, è indicato un attento monitoraggio degli elettroliti.
- I pazienti gravemente malnutriti sono più esposti al rischio di perdita di fluidi dalle ferite e richiedono un monitoraggio più frequente.
- Per evitare un'ischemia, non posizionare la medicazione in modo circonferenziale intorno alle appendici e indossare la fascetta per terapia SNAP™ quanto più lenta possibile.
- Smaltire se la confezione è aperta o danneggiata.
- Non posizionare i materiali della medicazione in tunnel inesplorati e ciechi.
- L'interfaccia in schiuma primaria non deve trovarsi a diretto contatto con strutture delicate come tendini, legamenti, nervi o vasi sanguigni. Per proteggere queste strutture delicate, deve essere usato un tessuto naturale per coprire e proteggere le strutture delicate.
- Durante il posizionamento iniziale dell'interfaccia in schiuma, contare il numero totale di pezzi collocati nella ferita e annotarlo come previsto dal protocollo della struttura.
- Durante la rimozione della medicazione, assicurarsi che tutti i pezzi, come documentato durante il posizionamento iniziale, ed eventualmente vengano rimossi dalla ferita. Se materiale della medicazione rimanesse accidentalmente nella ferita, non tentare di rimuoverlo. Monitorare la ferita e consultare un medico se necessario.
- Per la ferita esterna, si consiglia di applicare la medicazione almeno due volte a settimana e di cambiare la cartuccia per terapia SNAP™ almeno una volta a settimana; la frequenza della sostituzione può essere aumentata in base alla quantità di essudato. Per le incisioni chiuse, lasciare la medicazione in situ per un utilizzo continuo fino a un massimo di sette giorni.
- Medici, operatori sanitari e pazienti devono monitorare di frequente la ferita del paziente. Il tessuto circostante e il tessuto sano del paziente devono essere segni di infezione e altre condizioni secondarie come macerazione o necrosi del tessuto. L'infezione può essere grave e portare a complicanze come shock tossico e settico e/o una lesione letale.
- La cartuccia per terapia SNAP™ non è sicura per l'utilizzo con apparecchiature per imaging a risonanza magnetica (MRI). Non utilizzare in una stanza per MRI.
- Rordi appuntiti come i frammenti ossei devono essere rimossi dall'area del trattamento della ferita prima di collocare la medicazione lunga SNAP™, poiché sussiste il rischio di danneggiare la medicazione, con conseguente compromissione del funzionamento corretto del sistema terapeutico SNAP™, o di fratture di vasi sanguigni adiacenti o organi con conseguente emorragia.
- Non collocare il sistema terapeutico SNAP™ sul nervo vago per evitare di indurre bradicardia.
- Non collocare il sistema terapeutico SNAP™ su vasi fragili o vasi sanguigni infetti. Vasi infetti o indebboliti devono essere protetti e danneggiati, causando un sanguinamento che interferisce con il funzionamento del sistema.

PRECAUZIONI
- Analizzare con attenzione la corporatura e il peso del paziente quando si prescrive il sistema terapeutico SNAP™.
- Prestare attenzione a posizionare la cartuccia per terapia SNAP™ e il foro della medicazione in modo corretto per evitare il ristagno di essudato e cadere.
- Per ridurre il rischio di trasmissione di patogeni emessi, adottare le precauzioni standard per il controllo delle infezioni durante il cambio di pazienti, in base a protocollo ospedaliero.
- Il sistema terapeutico SNAP™ potrebbe non essere adatto al trattamento di pazienti aggressivi o poco inclini al rispettare delle prescrizioni.
- I pazienti possono fare la doccia o il bagno con il sistema terapeutico SNAP™. In quest'ultimo caso, non immergere il sistema terapeutico SNAP™ in acqua.
- La cartuccia e la fascetta per terapia SNAP™ vengono fornite non sterili e non devono essere sterilizzate.
- Conservare la cartuccia e la medicazione per terapia SNAP™ solo a temperatura ambiente e non esporre a calore o freddo eccessivo.

RESET DELLA CARTUCCIA PER TERAPIA SNAP™
La cartuccia per terapia SNAP™ può essere resettata secondo necessità seguendo le istruzioni fornite in base all'uso clinico, compreso il reset dopo una terapia OFF.
Se la cartuccia per terapia SNAP™ appare ritratta e l'indicatore di mandata della pressione rosso diventa visibile prima del raggiungimento della tenuta ermetica, resettare la cartuccia per terapia SNAP™ seguendo la procedura illustrata di seguito.

1. Rimuovere il raccordo del tubo dalla cartuccia per terapia SNAP™ premendo i pulsanti di rilascio ed estraendo il raccordo del tubo dalla cartuccia per terapia SNAP™ (**Fig. 13**). Non staccare il tubo dal raccordo.
2. Coprire l'apertura della cartuccia per terapia SNAP™ con una garza nel caso in cui nella cartuccia per terapia SNAP™ sia presente dell'essudato o del materiale della tecnologia BIOLOCK™ in gel.
3. Inserire la chiave di attivazione/reset nella fessura posta sull'estremità della cartuccia per terapia SNAP™ e premerla a fondo nella cartuccia per terapia SNAP™ finché l'indicatore di capacità verde non è visibile (**Fig. 14**).

NOTA: *Se la cartuccia viene posizionata attorno a un arto, assicurarsi che non si stringa troppo stretta onde evitare disagio o una possibile riduzione del flusso sanguigno verso l'arto. La perfusione distale può essere valutata osservando il colore della cute e eventuali alterazioni della sensibilità o della pulsazione.*

4. Se la tenuta ermetica sulla ferita è presente se:
- L'indicatore di capacità verde è visibile e fissa nella finestrella della camera.
- La medicazione appare come rivacchiata.
- La medicazione è dura al tatto.

In caso di problemi dopo il reset della cartuccia per terapia SNAP™, vedere la sezione **Risoluzione dei problemi**.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA PER TERAPIA SNAP™
Se l'indicatore di mandata della pressione rosso è visibile e la cartuccia per terapia SNAP™ è piena, la cartuccia per terapia SNAP™ non è più in grado di erogare pressione negativa e deve essere sostituita con una cartuccia per terapia SNAP™ nuova seguendo la procedura illustrata di seguito se si desidera proseguire il trattamento. Il trattamento con cartuccia per terapia SNAP™ oppure se un medico ha indicato di farlo.



1. Rimu

KCI USA, Inc.
12930 W. I-10 West
San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
www.acelity.com

CE 0086

EC REP
KCI Manufacturing
Unit/emdi Company
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
www.kci-medical.com

SNAP™ TERAPISYSTEM

BRUGERVEJLEDNING

SNAP™ Terapipatron
SNAP™ Sæt med lang forbindelse
SNAP™ Teraprem

FOAM

SYSTEMBESKRIVELSE

SNAP™ Terapisystemet omfatter en mekanisk drevet engangsanordning til pålæring af undertryk og et forbindingssæt til medicinsk anvendelse.
Ikke fremstillet af naturlig gummilatex.

FUNKTIONER I SNAP™ TERAPISYSTEM





INDIKATIONER

SNAP™ Terapisystemet er indikeret til patienter, der kan have behov for at sårbehandling ved pålægning af undertryk, særligt dér, hvordannet kan fremme sårheling ved fjernelse af overskydende eller eksudat, inklusive materiale og væsker/sekret. SNAP™ Terapisystemet er indikeret til fjernelse af små mængder eksudat fra kroniske, akutte, traumatiske, subakutte og dehiscente sår, ulcus Cruris, grundsygdom diabetes, tryk eller venøs insufficiens), lukkede operationssår, hudlapper og hudtransplantater.

VEJLEDNING FOR ANVENDELSE AF SYSTEMET (FORT.)

5. Anbring svampen i sårhulen i **fig. 5**. Svampen skal udfylde sårhulen og strække sig ud over sårområdet. Ved lukkede incisioner placeres interfacen over incisionen.

BEMÆRK: *Sørg for, at svampen anvendte sår, der er dybe, ikke er for stramme ved at stykke flere, når forbindingen åbnes. Hvis den bruges et stykke svamp i en tunnel, skal du sørge for, at svampen er i kontakt med svampen i den primære sårbund. Svampen må ikke anbringes i blinde eller i underminerede tunneler.*

6. Placer SNAP™ Lang forbinding over såret, og forseg i **fig. 6**. Sørg for, at den midterste 2cm-ring af portens på forbindingen er placeret over svampeinterfacen. Sørg for, at der er mindst 1 cm intakt hud rundt om såret fastgjort til forbindingen for at bevare korrekt forsegling.
7. Skær forbindingslagen ud i den ønskede længde i **fig. 7**.

BEMÆRK: *Snittet skal være lige, ikke vinkelskåret (fig. 8). Det vil give en korrekt forsegling, når slangen skæres til længdejustering.*

8. Indtast slangefittingen helt i slangen i **fig. 9**.

FORSIGTIG: *FJERN IKKE hætten fra enden af slangefittingen.*

9. Tilslut SNAP™ Terapipatronen til slangefittingen ved brug af begge hænder (**fig. 10**).
10. For at aktivere SNAP™ Terapisystemet skal du trykke hætten på aktiverings-/hulstillingstasten og trække den ud (**fig. 11**). Gennemdamt og gentag efter behov, indtil der er opnået en fuldstændig forsegling, og den røde indikator for kapacitet ikke længere er synlig i kammerens vindue.
11. Fastgør SNAP™ Terapisystemet til patientens ekstremitet eller bælte ved hjælp af SNAP™ Terapisystemets rem (**fig. 12**).

BEMÆRK: *Når remmen er placeret rundt om en ekstremitet, skal man sørge for, at remmen ikke strammes for meget, da det kan påvirke blodgennemstrømningen. Patienten skal føle sig komfortabel.*
Distal perfusion kan vurderes ved at lægge mærke til hudfarve, ændret fornemmelse eller puls.

12. Kontroller undersøgelsens funktion. SNAP™ Terapisystemet fungerer korrekt, hvis:
    - Den grønne kapacitetsindikator er tilstede synlig og konstant i kammerens vindue.
    - Forbindingen ser "nedsuget" ud.
    - Forbindingen er hårdt at føle på.

Det anbefales jævnligt at efterse SNAP™ Terapisystemet, så det eventuelt tab af leveringen af undertryk kan opdages i tide.

BEMÆRK: SNAP™ Terapisystemet skal efterses mindst hver ottende time. *Ved dårse sår anbefales det at udskifte forbindingen mindst to gange om ugen. Hyppigheden justeres efter klinikerens skøn. Ved lukkede incisioner kan man lade forbindingen sidde i op til syv dage.*



KONTRAINDIKATIONER

SNAP™ Terapisystemet må ikke anbringes over:

- Ufiltrerarkeret drænede sår
- Nekrotisk væv uden sorte skorper eller klarbrede dødt væv
- Synlige blodkar, anastomoserester, organer, senер eller nerver
- Sår, der indeholder malignitet
- Fistler
- Ubehandlet osteomyelitis
- Kendt allergi mod latex

ADVARSLER

- Der er en betydelig blødningsrisiko under overvågning af kvalificeret klinisk personale, og at brugeren har den nødvendige uddannelse i og kendskab til den specifikke medicinske anvendelse, som SNAP™ Terapisystemet anvendes til. Det kan være til fornyet produktvalgte og risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis alle instruktioner og sikkerhedsinformation til terapienheden og forbindingen ikke følges nøje langvs og følges før hver brug.
- SNAP™ Terapisystemet er ikke blevet undersøgt på pædiatriske patienter.
- Kun til brug med en enkelt patient. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensterilliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering vil påvirke enhedens strukturelle integritet og/eller føre til ydeevnesvigt, som kan resultere i patientskader eller dødsfald.
- Brug ikke forbindingen på patienter, som er allergiske over for hydrokolloide klæbestoffer eller polyurethanskum.
- Kompromitter ikke indehvidt sårekssudat eller stivnet BIOLOCK™ materiale, når SNAP™ Terapipatronen anbringes over sår, der undgår udtørring af eksudat eller BIOLOCK™ materiale.
- Lad aldrig SNAP™ Lang forbinding sidde uden aktiver undertryk undtagen under klinisk overvågning. Hvis den røde indikator for tryksyning bliver synlig, er undertrykket ikke længere aktivt.
- Fuldstændig tørring kan medføre, at forbindingen fastsidder eller bliver ubehagelig at fjerne, når den normale funktion af SNAP™ Terapisystemet.
- Ekstra pleje og overvågning er påkrævet for patienter, som er i behandling med antikoagulanda eller trombocythæmmende midler, fordi blødning kan påvirke den normale funktion af SNAP™ Terapisystemet.
- Inficerede sår bør overvåges nøje og kan kræve hyppigere forbindingsskift. Klinikere og patienter/plejepersonale skal hyppigt undersøge såret, være i alvorstilfælde sårt eksudat for tegn på infektion, forværret infektion eller andre komplikationer. Tegn på infektion kan være feber, ømhed, rødme, hævelse, varme, smerte, lugt eller øget eksudat. Hvis der opstår tegn på infektion, skal SNAP™ Terapisystemet fjernes, og der skal iværksættes passende behandling. Hvis infektion kan være alvorlig og medføre komplikationer, f.eks. sepsis, dårlige, feber, kuldefornd, kvalme, chok, septisk chok og/eller dødsfald. Tegn på systemisk infektionen er kvalme, opkastning, diarré, pludselig opstået lavt blodtryk (hypotension), høj puls (takykardi), svimmelhed eller ændret mental tilstand (forvirring). Hvis ikke, rehæver og/eller ortostatisk hypotension eller ortostatiske symptomer (svimmelhed eller svimmelhed) skal der tegn på åbenlyndende systemisk infektion eller blodforgiftning (infektion på kroppen). Ved tegn på kontaktes for at beslutte, om terapien skal afbrydes.
- Der bør udvises forsigtighed ved brug af SNAP™ Terapisystemet på patienter med nygrnarvslæsion, da stimulus fra placering, påbegyndelse eller ophør af undertryk kan medføre autonom dysreflexia. Hvis en patient, der anvender SNAP™ Terapisystemet, oplever autonom dysreflexia, skal brugeren af systemet afbrydes, og der skal søges lægehjælp.

- Forbindingen skal fjernes før defibrillering. hvis den sidder i nærheden af patientens pacemaker.
- Elektrisyk- og varmekilde kan opstå fra stærkt eksudererende sår. I sådanne tilfælde kan nøje overvågning af elektrolytter være indiceret.
- Patienter med alvorlig underernæring kan have større risiko for vævstørkat fra deres sår og kan kræve hyppigere overvågning.
- For at forhindre indvækst af forbindingen ikke placeres cirkulært rundt om vedhæng, og SNAP™ Terapiremmen skal bæres så løst som muligt.
- Kun til brug med produkter, som anbefalet i denne folder.
- Anbring ikke forbindingsmaterialerne i blinde eller u-understøtte tunneler.

Den primære svampeinterface skal ikke være i direkte kontakt med skrøbelige strukturer som fx, blodkar, organer eller nerver. Der bør anvendes beskyttelse, ikke-klæbende kunstigt væv eller naturlige vævsstrukturer for at dække over og beskytte strukturerne.

- Ved den indledende placering af svampeinterfacen skal man tætte det samlede antal af stykker, der placeres i såret, og den indledende mængde eksudat anbragt i sårhulen.
- Ved fjernelse af forbindingen skal man sikre sig, at alle stykker dokumenteret i løbet af den første placering samt eventuelle fragmenter fjernes fra sårhulen. Utilstrækt retention af forbindingsmaterialer i løbet af perioden kan medføre infektion, irritation eller andre komplikationer.
- Ved åbne sår anbefales det at udskifte forbindingen mindst to gange om ugen, og at udskiftede SNAP™ Terapisystemet kasseres. Hyppigheden justeres efter klinikerens skøn. Ved lukkede incisioner kan man lade forbindingen sidde til kontrol mindst hver syvende dag.
- Klinikere, plejepersonale og patienter skal hyppigt overvåge patientens sår, være i alvorstilfælde sårt eksudat for tegn på infektion, forværret infektion eller andre komplikationer som feber, kuldefornd, kvalme, chok, septisk chok og/eller dødsfald. Tegn på systemisk infektionen er kvalme, opkastning, diarré, pludselig opstået lavt blodtryk (hypotension), høj puls (takykardi), svimmelhed eller ændret mental tilstand (forvirring). Hvis ikke, rehæver og/eller ortostatisk hypotension eller ortostatiske symptomer (svimmelhed eller svimmelhed) skal der tegn på åbenlyndende systemisk infektion eller blodforgiftning (infektion på kroppen). Ved tegn på kontaktes for at beslutte, om terapien skal afbrydes.
- Der bør udvises forsigtighed ved brug af SNAP™ Terapisystemet på patienter med nygrnarvslæsion, da stimulus fra placering, påbegyndelse eller ophør af undertryk kan medføre autonom dysreflexia. Hvis en patient, der anvender SNAP™ Terapisystemet, oplever autonom dysreflexia, skal brugeren af systemet afbrydes, og der skal søges lægehjælp.



1. Fjern slangefittingen fra SNAP™ Terapisystemet ved at trykke på udløsningsknappene og trække slangefittingen ud af SNAP™ Terapipatronen (**fig. 13**). Fjern ikke slangen fra slangefittingen.
2. Dæk åbningen på SNAP™ Terapisystemet med gaze. Tryk ikke på udløsningsknappen. Tryk på aktiverings-/hulstillingstasten i SNAP™ Terapisystemet. Brug altid passende personlige værnemidler (PPE) ved håndtering af SNAP™ Terapisystemet.
3. Indsæt aktiverings-/hulstillingstasten i åbningen for enden af SNAP™ Terapipatronen, og skub aktiverings-/hulstillingstasten fremad og ind i SNAP™ Terapipatronen, indtil den klikker på plads (**fig. 14**).
4. Se instruktionerne fra trin 9 ligeledes **Vejledning for anvendelse af systemet**; for at tilslutte SNAP™ Terapipatronen igen.

Forseglingen af såret er luftfast, hvis:

- Den grønne kapacitetsindikator er både synlig og konstant i kammerets vindue.
- Forbindingen ser "nedsuget" ud.
- Forbindingen er hård at føle på.

Se afsnittet **Fejlfinding**, hvis der er opstået et problem efter nulstilling af SNAP™ Terapisystemet.

NULSTILLING AF SNAP™ TERAPIPATRONEN

SNAP™ Terapipatronen nulstilles efter behov i henhold til denne vejledning som nødvendigt for den klinisker brug, herunder nulstilling efter trykkammerbehandling.

Hvis SNAP™ Terapipatronen trækker lige tilbage og den røde tast på aktiverings-/hulstillingstasten og trække den ud (**fig. 11**). Gennidaet og gentag efter behov, indtil der er opnået en luftætt forsegling, og den røde indikator for kapacitet ikke længere er synlig i kammeren.

11. Fastgør SNAP™ Terapisystemet til patientens ekstremitet eller bælte ved hjælp af SNAP™ Terapisystemets rem (**fig. 12**).

BEMÆRK: *Når remmen er placeret rundt om en ekstremitet, skal man sørge for, at remmen ikke strammes for meget, da det kan påvirke blodgennemstrømningen. Patienten skal føle sig komfortabel.*
Distal perfusion kan vurderes ved at lægge mærke til hudfarve, ændret fornemmelse eller puls.

12. Kontroller undersøgelsens funktion. SNAP™ Terapisystemet fungerer korrekt, hvis:
    - Den grønne kapacitetsindikator er både synlig og konstant i kammerens vindue.
    - Forbindingen ser "nedsuget" ud.
    - Forbindingen er hård at føle på.

Det anbefales jævnligt at efterse SNAP™ Terapisystemet, så det eventuelt tab af leveringen af undertryk kan opdages i tide.

BEMÆRK: SNAP™ Terapisystemet skal efterses mindst hver ottende time. *Ved dårse sår anbefales det at udskifte forbindingen mindst to gange om ugen. Hyppigheden justeres efter klinikerens skøn. Ved lukkede incisioner kan man lade forbindingen sidde i op til syv dage.*

UDSKIFTNING AF SNAP™ TERAPIPATRONEN

Hvis den røde indikator for tryksyning er synlig og SNAP™ Terapipatronen er fuld, kan SNAP™ Terapipatronen ikke længere levere undertryk og skal udskiftes med en ny SNAP™ Terapipatron ved følge trinene nedenfor. Hvis påtrængere efter fuld ikke behandling med SNAP™ Terapipatronen anvendes eller indicieres af en lege.



1. Fjern slangefittingen fra SNAP™ Terapipatronen ved at trykke på udløsningsknappene og trække slangefittingen ud af SNAP™ Terapipatronen (**fig. 15**).

FORSIGTIG: *FJERN IKKE hætten fra enden af slangefittingen.*

2. Tilslut en ny SNAP™ Terapipatron til slangefittingen ved brug af begge hænder (**fig. 16**). Der hares et klik, når fittingen er korrekt tilsluttet.
3. Aktiver SNAP™ Terapisystemet som beskrevet i afsnittet **Vejledning for anvendelse af systemet** (Trin 10). Bortskaf den brugte SNAP™ Terapipatron i henhold til institutionens procedurer.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Der er ikke luftstet forsegling ved sårbehandlingens start, den røde indikator for tryksyning **ER** synlig. ELLER Den grønne kapacitetsindikator er ikke konstant synlig i kammerens vindue.	• Slangeforbindelserne er ikke sikre. • Der kan være lækage ved interfacen mellem hydrokolloid og hud.	• Kontrollér, at slangeforbindelserne er sikre. • Glat forbindingen ud med fingrene for at forme sårkrop. • Forsegl forbindingens kanter med yderligere SNAP™ Tegaderm™ Forbinding. • Påfør SNAP™ Securfilm™ Hydrokolloid på kanten af forbindingen for at forsegle særskilte anatomiske områder.
Der er ikke luftstet forsegling ved såret, og den grønne kapacitetsindikator er konstant.	• Slangen kan være tilstoppet. • Forbindingen kan være tilstoppet.	• Undersøg slangen for mulige tilstoppninger eller knæk. Hvis der findes tilstoppninger, skal slangen rettes ud eller SNAP™ Terapiforbindingen udskiftes. • Der kan være tilstopning inden i sårforbindingen. Udskift sårforbindingen.

RENGØRING

Hvis SNAP™ Terapisystemet bliver tilsmudset, skal nedenstående retningslinjer følges:

- Rengør med en blød, fugtig klud.
- Tør med en tør klud.
- Undgå at anvende ætsende eller slibende kemikalier.

FORSIGTIG: *Nedsænk ikke SNAP™ Terapisystemet i vande.*

SYMBOLFORKLARING

FORSIGTIG:
I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr udleies af eller på ordination af en læge

3M™ Tegaderm™ er et varemærke, der tilhører 3M™ Corporation. Medmindre andet er angivet i teksten, tilhører alle varemærker, der vises i dette dokument KCI Licensing, Inc., dets datterselskab eller licensgivere. Copyright 2018 KCI Licensing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 418842 Rev B 9/2018

SNAP™ BEHANDLINGSSYSTEM

BRUKSANVISNING

SNAP™ behandlingskassett
SNAP™ langt forbandssystem
SNAP™ behandlingsrem

FOAM

SVENSKA

BESKRIVNING AV SYSTEMET

SNAP™ behandlingssystem inkluderar en mekanisk driven engångsenhet för applicering av negativt tryck och ett förbandsmaterial för medicinsk applikationer.
Ej tillverkad med naturlig gummilatex.

FUNKTIONER FÖR SNAP™ BEHANDLINGSSYSTEM

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

SNAP™ behandlingssystem är avsett för patienter där sårbehandling med negativt tryck gör nytta, särskilt där det kan främja sårläkning genom avlägsnande av överskott av vätska/exsudat, inklusive material och vätska/exsudat, akuta, traumatiska, subakuta och partiellt dehiscenta sår, diabetiska sår, sår som beror på venös insufficiens, trycksår, sluten kirurgiska incisioner, lambäck och transplantat.

ANVISNINGAR OM APPLICERING AV SYSTEMET (FORTS.)

5. Placera kontaktdynan i sårhålan (**fig. 5**). Kontaktdynan bör fylla sårhålan och sträcka sig ovanför sårkanterna. För sluta incisioner, placera kontaktdynan över incisionen.

OBS! *Räkna och registrera antalet delar som används för att säkerställa att samma antal delar tas bort under bortagning av förbandet. Om en bit av kontaktdynan används i en fistel, måste man se till att den är i kontakt med kontaktdynan i den primära sårbädden. Placera inte svampförband på djupa/stora underliska fistlar.*

6. Placera SNAP™ långt förband över sårt och försegla (**fig. 6**). Säkerställ att mittenöppningen på portén på förbandet är placerad över kontaktdynan. Säkerställ att förbandet sitter fast på minst 1 cm av oskadad hud runt såret, för att bibehålla en lämplig försegling.
7. Klipp förbandslagren till önskad längd i **fig. 7**.

OBS! *Snittet ska vara rakt, inte i en vinkel (fig. 8). Detta ger en korrekt försegling vid anslutningen till slanglåsningen.*

8. För in slangbyglen helt i slangen (**fig. 9**).

VIKTIGT! *Ta INTE bort locket på slanglåsningsänden.*

9. Anslut SNAP™ behandlingssystem till slanglåsningsänden med båda händerna (**fig. 10**).
10. Aktivera SNAP™ behandlingssystem genom att trycka på och dra ut knappen för aktivering/återställning (**fig. 11**). Tryck in igen och upprepa vid behov tills ett fullstå försegling uppnås och den röda indikatorn för kapacitet inte längre är synlig i tryckkammarfönstret.
11. Fäst SNAP™ behandlingssystem vid patientens extremitet eller bälte med användning av SNAP™ behandlingsrem (**fig. 12**).

OBS! *När remmen placeras runt en extremitet måste man vara noga med att säkerställa att remmen inte sitter för hårt, eftersom detta kan orsaka obehag eller potentiellt minska blodflödet till extremiteten. Distal perfusion kan bedömas genom observation av hudfärgen, förändrad känsel eller puls.*

12. Kontrollera att det negativa trycket fungerar. SNAP™ behandlingssystem fungerar korrekt om:
    - Den grönа kapacitetsindikatorn är både synlig och lyser med fast sken i kammarfönstret.
    - Förbandet har ett "nedsuget" utseende.
    - Förbandet känns hårt vid beröring.

Regelbunden visuell inspektion av SNAP™ behandlingssystem rekommenderas, så att alltså av tillförsel av negativt tryck kan upptäckas i tid.

OBS!! Som minst bör SNAP™ behandlingssatsett inspekteras en gång var åttonde timme. *Byte av förband på djupa sår rekommenderas minst två gånger per vecka, men kan justeras av läkaren enligt vad som är lämpligt. För slutna incisioner kan förbandet lämnas kvar i upp till 7 dagar.*

KONTRAINDIKATIONER

Placera inte SNAP™ behandlingssystem över:

- ofiltrerade/dränerande sår
- nekrotisk vävnad täckt av svarta skorpor
- synliga blodkärl, anastomotiska platser, organ, senor eller nerver
- sår som innehåller malignitet
- fistlar
- obehandlad osteomyelit
- sår med aktiv blödning.

VARNINGAR

- Det är ett villkor för användning att enheten drivs under övervakande av kvalificerad klinisk vårdpersonal och att användaren har nödvändig utbildning och kunskap om den specifika medicinska applikationen för vilken SNAP™ behandlingssystem används. Underlåtenhet att följa dessa villkor och/eller att noggrant läsa och följa alla instruktioner om användning av behandlingsenheten och applicering av förband, samt säkerhetsinformation, före användning kan leda till att enheten fungerar på ett sätt som risk för allvarliga eller dödliga skador.
- SNAP™ behandlingssystem har inte testats på pediatriska patienter.
- Endast för enpatientbruk. Får ej återanvändas, rengöras eller resteriliseras. Återanvändning, omsterilisering eller rengöring kan äventyra enhetens strukturella funktioner, och/eller leda till enhetsfel, som i sin tur kan leda till skada eller sjukdom för patienten.
- Använd inte förbandet på patienter med allergi mot hydrokolloidklibbor eller polyuretanfilm.
- Kompromissa inte sårexsudat i BIOLOCK™-material som gäller sig när SNAP™ behandlingssatsett återställs, för att förhindra avlägsnande av exsudat eller BIOLOCK™-material.
- Lämna aldrig SNAP™ långt förband på plats utan aktiv behandling med negativt tryck, såvida detta inte sker under klinisk övervakning. Om den röda indikatorn för tryckavlastning syns är negativt tryck inte längre aktivt.
- Fullständig torkning kan medföra att förbandet fastnar eller blir obekvämt att avlägsna när SNAP™ behandlingssystem återställs, för att förhindra avlägsnande av exsudat eller BIOLOCK™-material, som bör behandlas som biomedicinskt avfall och kasseras enligt sjukhusets rutiner.
- Se anvisningarna från Steg 9 (avsnittet **Anvisningar om applicering av systemet;** för att återställa SNAP™ behandlingssystem.

Luftstat förslegling är närvarande vid såret om:

- Den grönа kapacitetsindikatorn är både synlig och lyser med fast sken i kammarfönstret.
- Förbandet har ett "nedsuget" utseende.
- Förbandet känns hårt vid beröring.

Om problem förekommer efter att SNAP™ behandlingssatsett återställts, se avsnittet **Felsökning**.



ÅTERSTÄLLA SNAP™ BEHANDLINGSKASSETT

SNAP™ behandlingssatsett kan återställas efter behov, enligt dessa anvisningar och enligt vad som krävs för klinisk användning, inklusive återställning efter tryckkammarbehandling.

Om SNAP™ behandlingssatsett dras in och den röda indikatorn för tryckavlastning syns innan luftstät förslegling etableras, ska SNAP™ behandlingssatsett återställas med hjälp av följande steg:

1. Ta bort slanglåsningsbyglen från SNAP™ behandlingssatsett genom att trycka på utlösningsknapparna och dra ut slanglåsningsbyglen ur SNAP™ behandlingssatsett (**fig. 13**). Ta inte bort slangen från slanglåsningsbyglen.
2. Täck öppningen på SNAP™ behandlingssatsett med en kompress om exsudat eller gelkår BIOLOCK™ teknikmaterial förekommer i SNAP™ behandlingssatsett. Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning när återställning av SNAP™ behandlingssatsett.
3. För in aktiverings-/återställningsknappen i skåran i änden av SNAP™ behandlingssatsett och tryck hela vägen in i SNAP™ behandlingssatsett (**fig. 14**). Ett klickljud ska höras när aktiverings-/återställningsknappen fästs på plats.
4. Aktivera SNAP™ behandlingssatsett (läsom beskrivs i avsnittet **Anvisningar för systemapplicering** (Steg 10). Kassera använd SNAP™ behandlingssatsett enligt sjukhusets rutiner.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Luftstät förslegling inte är närvarande vid sårbandet och den röda indikatorn för tryckavlastning **SYNS.** ELLER Den grönа kapacitetsindikatorn lyser inte med fast sken i kammarfönstret.	• Slanganslutningarna sitter eventuellt inte ordentligt. • Läckage förekommer eventuellt vid kontaktytan mellan hydrokolloid och hud.	• Kontrollera att slanganslutningarna sitter åt ordentligt. • Tätta sårbandet med fingrarna för att platta ut veck. • Försegla förbandets kanter med ytterligare 3M™ Tegaderm™ Förband. • Applicera SNAP™ Securfilm™ hydrokolloid på förbandets kanter, för att försegla svåråtkomliga anatomiska ställen.
Luftstät förslegling är inte närvarande vid såret och den grönа kapacitetsindikatorn lyser med fast sken.	• Slangen kan vara tilltäppt. • Förbandet kan vara tilltäppt.	• Undersök om det finns tilltäppningar eller veck på slangen. Om sådana påträffas ska slangen rätas ut eller SNAP™ behandlingsförband bytas ut. • Tilltäppningen kan finnas inuti sårbandaget. Byt ut sårbandaget.

BYTA UT SNAP™ BEHANDLINGSKASSETT

Om den röda indikatorn för tryckavlastning syns och SNAP™ behandlingssatsett är full, har SNAP™ behandlingssatsett förlorat sin förmåga att tillföra negativt tryck och måste bytas ut mot en ny SNAP™ behandlingssatsett enligt stegen nedan, om ytterligare eller fortsatt behandling med SNAP™ behandlingssystem önskas eller indikeras av läkare.

1. Ta bort slanglåsningsbyglen från SNAP™ behandlingssatsett genom att trycka på utlösningsknapparna och dra ut slanglåsningsbyglen ur SNAP™ behandlingssatsett (**fig. 15**).

VIKTIGT! *Ta INTE bort locket på slanglåsningsens ände.*

2. Anslut en ny SNAP™ behandlingssatsett till slanglåsningsbyglen med båda händerna (**fig. 16**). Ett klickljud hörs när slanglåsningsbyglen är korrekt fastsatt.
3. Aktivera SNAP™ behandlingssatsett (läsom beskrivs i avsnittet **Anvisningar för systemapplicering** (Steg 10). Kassera använd SNAP™ behandlingssatsett enligt sjukhusets rutiner.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Luftstät förslegling inte är närvarande vid sårbandet och den röda indikatorn för tryckavlastning **SYNS.** ELLER Den grönа kapacitetsindikatorn lyser inte med fast sken i kammarfönstret.	• Slanganslutningarna sitter eventuellt inte ordentligt. • Läckage förekommer eventuellt vid kontaktytan mellan hydrokolloid och hud.	• Kontrollera att slanganslutningarna sitter åt ordentligt. • Tätta sårbandet med fingrarna för att platta ut veck. • Försegla förbandets kanter med ytterligare 3M™ Tegaderm™ Förband. • Applicera SNAP™ Securfilm™ hydrokolloid på förbandets kanter, för att försegla svåråtkomliga anatomiska ställen.
Luftstät förslegling är inte närvarande vid såret och den grönа kapacitetsindikatorn lyser med fast sken.	• Slangen kan vara tilltäppt. • Förbandet kan vara tilltäppt.	• Undersök om det finns tilltäppningar eller veck på slangen. Om sådana påträffas ska slangen rätas ut eller SNAP™ behandlingsförband bytas ut. • Tilltäppningen kan finnas inuti sårbandaget. Byt ut sårbandaget.

HYPERBAR SYRGASBEHANDLING (HBO)

Ta inte in SNAP™ behandlingssatsett. SNAP™ rem eller slanglåsningsbyglen om övertryckskammare (HBO), eftersom de inte har studerats för användning i denna miljö och kan utgöra en risk för patienten. När förbandslangen har kopplats bort från slanglåsningsbyglen ska den öppna änden av förbandslangen täckas med en bomullsboll eller liknande, fixerad med tejp. SNAP™ förbandet med ett annat HBO-kompatibelt material under hyperbar behandling.

VIKTIGT! *Använd inte SNAP™ under HBO-behandling.*

Återuppta behandling med negativt tryck efter HBO-behandling genom att ta bort kompressen från gången, sätta av ny 1-mm (0,2 tum) av slangen för att avlägsna förorenad del och sätta tillbaka slanglåsningsbyglen. Se avsnittet **Återställa SNAP™ behandlingssatsett** för att återställa SNAP™ behandlingssatsett.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

KCI FÖRKLARAR UTTRYCKLIGEN ATT ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FRÅNSÄGS HÄRMED FÖRUTOM I DEN MÅN SÅDANA GARANTIER SOM ERBJUDS AV KCI BESKRIVS UTTRYCKLIGEN I DEN HÄR PUBLIKATIONEN ELLER INKLUDERAS I MED PRODUKTEN. KCI TAR INTE ANSVAR FÖR NÅGRA ÖVERSÄTTNINGSFEL SOM KAN UPPSTÅ. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL KCI, DIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER KONTRAKTER, INKLUSIVE SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, ÄVEN OM KCI HAR BLIVIT UNDERRÄTTAD OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER INTE I DE FALL DÄR LAGEN FÖRBJUDER DET. INGEN PERSON HAR BEHÖRIGHET ATT BINDA KCI TILL NÅGON UTFÄSTELSE ELLER GARANTI, ANNAT ÄN VAD SOM SPECIFIKT ANGES I DET HÄR STYCKET.

Beskrivningar eller specifikationer i KCI:s trycksaker, inklusive den här publikationen, är endast avsedda att allmänt beskriva produkten vid tidpunkten för publikationen och utgör inte någon utfästelse gentemot någon part vad som är angivet i den skriftliga begränsade garantin som medföljer den här produkten. Informationen om hur publikationen kan ändras när som helst. Kontakta KCI för uppdaterad information.

INSTRUKTIONER TILL LÄKAREN

SNAP™ behandlingssatsett finns i tre modeller, där var och en kan skapa en förinställd nivå av negativt tryck (–75, –100 och –125 mmHg). Före placering av SNAP™ behandlingssystem måste läkaren bestämma hur man optimalt använder systemet för ett enskilt sår.

Det är viktigt att noggrant utvärdera såret och patienten, för att säkerställa att indikationerna för användning är uppfyllda.

Dessa allmänna riktlinjer bör följas:

- Nivån av negativt tryck bör aldrig vara smärtsam för patienten. Om en patient rapporterar obehag med en viss trycknivå bör en SNAP™ behandlingssatsett med lägre nivå av negativt tryck övervägas. Kontakta en vårdgivare för ytterligare anvisningar.
- Om patienten rapporterar obehag med –75 mmHg-modellen, bör behandlingen med SNAP™ behandlingssatsett avbrytas.

Instruktionerna för läkare/vårdpersonal bör innehålla:

- nivå av negativt tryck som ska användas
- frekvens för förbandsbyte
- kompletterande förband som ska användas
- patientutbildning och vägledning
- orsakad behandlingsduration och/eller slutpunkt

Gå igenom instruktionerna med patienten och/eller vårdpersonal, och se till att patienten och/eller vårdpersonalen förstår dem helt.

Se till att patienten och/eller vårdpersonalen förstår följande innan användningen:

- Frekvens av inspektion av SNAP™ behandlingssatsett (minst var åttonde timme).
- Återställ SNAP™ behandlingssatsett när den röda tryckavlastningsindikatorn syns, och SNAP™ behandlingssatsett är full.
- Byt ut SNAP™ behandlingssatsett när den röda tryckavlastningsindikatorn syns, och SNAP™ behandlingssatsett är full av exsudat/BIOLOCK™ Gel.

RENGÖRING

Om SNAP™ behandlingssystem blir smutsigt, följ de allmänna riktlinjerna nedan:

- Rengör med

SNAP™ TERAPİ SİSTEMİ
KULLANIM TALİMATLARI

SNAP™ Terapi Kartuşu
SNAP™ Uzun Pansuman Kiti
SNAP™ Terapi Askısı

FOAM

TÜRKÇE

SİSTEM TANIMI

SNAP™ Terapi Sistemi, tıbbi uygulamalarda negatif basınç uygulanmasını sağlayan mekanik tahrikli tek kullanımlık bir cihaz ve pansuman kiti içerir.

Doğal kauçuk lateks içermez.

SNAP™ TERAPİ SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ



KULLANIM ENDİKASYONLARI

Cihaz aşırı eksudaya, enfeksiyöz materyali ve doku debrisini ataruk yaranın iyileşmesini kolaylaştırdığı ve SNAP™ Terapi Sistemi'nin yaranın iyileşmesini geciktirmediği yara türlerinin tedavisi için endikedir. SNAP™ Terapi Sistemi kronik, akut, travmatik, subakut ve açılmış yaralar, ülser (bypassitik, venöz ya da basi gibi), cerrahi olarak kapatılmış insizyonlar, flepler ve greftlerden ar miktarında eksudanın atılmasında endikedir.

SİSTEM UYGULAMA TALİMATLARI (DEVAMI)



5. Köpük ara katmanını yara kavitesine yerleştirin (**Şek. 5**). Köpük ara katmanı yara kavitesini doldurmalı ve yara kenarlarının dışına uzanmalıdır. Kapatılmış insizyonlar için ara katmanı insizyonun üzerine yerleştirin.

NOT: *Pansuman çıkarılırken ayrıca yaraya pansuman çıkarıldığından emin olmak için kullanılan parça sayısını belirleyin. Bir köpük parçası tüneli içinde kullanılmışsa köpüğün tümü yara yatağından çıkarılmadan önce kalan köpüğün bir veya kesikli/kenarlı insizyonlar için yerleştirilmesi.*

6. SNAP™ Uzun Pansuman yaranın yerleştirin ve sızdırmazlığı sağlayacak şekilde kapatın (**Şek. 6**). Pansuman üzerindeki Portun orta deliğinin, köpük ara katmanın üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Sızdırmazlığın korunabilmesini için yara çevresinde en az 1 cm'lik sağlam derinin pansumana yapışığından emin olun.
7. Pansuman horumunu sterilden boşaltıp kesin (**Şek. 7**).

NOT: *Pansuman açık değil, dışı bir şekilde kesilmelidir. Şek. 8: Böylece, horum bağlantı parçasına bağlandığında sızdırmazlık sağlanır.*

8. Horumu pansuman kesiminden yaraya şekilde takın (**Şek. 9**).

DİKKAT: *Horumu bağlantı parçasının ucundaki başlığı ÇIKARMAYIN.*



9. SNAP™ Terapi Kartuşu iki elinizle horumun bağlantı parçasına bağlayın (**Şek. 10**).
10. Kartuşu, kartuş dekli pansumanın üzerinde yeşil etiketçiğe hizalanana anahtarına basıp dışarıya doğru çekin (**Şek. 11**). Tendon takım ve fleve engellerini sağlanana ve basınç tahliye penceresindeki kırmızı renk kaybolana kadar kartuşu çekmeye devam edin (**Şek. 12**).
11. SNAP™ Terapi Askısını kullanmak SNAP™ Terapi Sistemini ekstremitenize veya kemerinize bağlayın (**Şek. 12**).

NOT: *Askının bir ekstremiteye bağlandığından, kullanıldığı nedenin olabilecegi veya ekstremitenin yaralanmasına yol açabilecek herhangi bir durumdan emin olun. Cihazın ıslanmasını önlemek için, Cihazı duyusal değişikliklere veya hastaya dikkat etmesi dikkat etmesi gerekmeyen bir yerleştirin.*

12. Negatif basınç işlemini kontrol edin. Aşağıdaki durumlar SNAP™ Terapi Sisteminin düzgün çalıştığını gösterir:
    - Yeşil kapasite göstergesi hazne penceresinde görünüyorsa ve sabitse.
    - Pansuman "vakumlanmış" gibi görünüyorsa.
    - Pansuman dokunduğunda sert hissediliyorsa.

Negatif basınç işlemini kontrol etmek için aşağıdaki durumlar negatif basınç tedavisinin çalıştığını gösterir:

- Yeşil kapasite göstergesi hazne penceresinde görünüyorsa ve sabitse.
- Pansuman "vakumlanmış" gibi görünüyorsa.
- Pansuman dokunduğunda sert hissediliyorsa.

NOT: **SNAP™ Terapi Kartuşu en az sekiz saat boyunca kullanılmalıdır.** *Aynı zamanda pansumanın değiştirilmesi gerektiğine karar vermeden önce yaranın durumunu değerlendirin. Kapatılmış insizyonlar için pansuman en üstte 7 gün boyunca yerinde bırakılabilir.*

KONTRENDİKASYONLAR

SNAP™ Terapi Sistemini şunların üzerine yerleştirmeyin:

- Yeterli derinlig uygulanmamış yaralar
- Yara kabuğu veya yapışkan rim gibi nekrotik dokular
- Açıklaki kan damarları, anastomoz bölgeleri, organlar, tendonlar veya sinirler
- Maligniter yaralar
- Fistüller
- Tedavi edilmemiş Osteomiyelit
- Aktif kanamalı yaralar

UYARILAR

- Cihaz yalnızca kalifiye bir klinik hasta bakımı gözetimi altında ve SNAP™ Terapi Sistemini kullanılmakta olduğu söz konusu tıbbi uygulama konusunda gerekli eğitim ve bilgiye sahip bir kullanıcı tarafından kullanılmalıdır. Bu kapsama yalnızca ve veya tesis sistemlerini kullanmış ve tüm pansuman uygulama talimatlarını ve güvenlik bilgilerinin dikkatli bir şekilde okunarak uygulanmasını, değerlendirmesi ve endikasyonlara uygulanmasını ve etkiyle ilgili sorumlu olacaktır.
- SNAP™ Terapi Sistemi pediatrik hastalarda incelenmemiştir.
- Yalnızca tek hastada kullanın (yalnız). Yeniden kullanmayın, yeniden işleme tabi tutmayın veya yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanım, yeniden işleme tabi tutma veya yeniden sterilizasyon, cihazın yapısal bütünlüğünü ve/veya hastalarda yaralanma veya hastalıkla sonuçlanabilecek cihaz arızalarına neden olabilir.
- Pansuman hidrokolloid yapışkanlara veya poliüretan filmlere karşı alerjisi olan hastalarda kullanmayın.
- SNAP™ Terapi Kartuşunu sıfırlarken eksudanın SNAP™'ye ulaşmasını engellemek için pansuman hidrokolloid™ pansumanının veya pansumanın üzerine yerleştirmeyin.
- Klinik gözetimi altında yapılmadığı sürece SNAP™ Uzun Pansuman etkin negatif basınçlı terapi cihazının kartuşu olarak yanma amacıyla kullanmayın. Kornea bantaj tahliye göstergesinin yeşilden kırmızıya geçtiğini bunun artık etkin olmadığını gösterir.
- Kanama, SNAP™ Terapi Sistemini sonlandırmak şekilde çalışmasını engelleyebileceği için sistem kullanılmadan önce tam hemostazı sağlanmalıdır.
- Kanama, SNAP™ Terapi Sistemini sonlandırmak şekilde çalışmasını engelleyebileceği için antikoagülan veya platelet agregasyon inhibitörü kullanan hastalar için ekstra bakım ve izleme gerekir.
- Enfekte yaralar aşırı eksudatif ve daha az pansuman değişikliği gerektirebilir. Yeterli enfeksiyon ve hastalar/hasta bakıcılar yaraya, yara çevresindeki dokuya ve eksudaya enfeksiyon, enfeksiyonun kötüleşmesi veya diğer komplikasyon belirtilerine karşı dikkatli olmalıdır. Cerrahi girişler, kısmi/tam kalınlıklı yaralar, kanamalı yaralar veya çevresindeki alanda sıcaklık artışı, şişmiş alanlar, ağrı, kızarıklık, ödem, kötü kokulu akıntı, yara yatağında granülasyon dokusu olmaması, yara kenarları, kötüşük yok, septik şok veya/veya ölümcül yaralar gibi komplikasyonlara yol açabilir. Sistemik enfeksiyona yönelik bazı belirtiler bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, mukoz membranlarda veya cilt rengi değişiklikleri olarak kendini gösterebilir. Kemo bazlı tahliye göstergesinin yeşilden kırmızıya geçtiğini ve SNAP™ Terapi Sisteminin artık etkin olmadığını gösterir.
- Kanama, SNAP™ Terapi Sistemini sonlandırmak şekilde çalışmasını engelleyebileceği için sistem kullanılmadan önce tam hemostazı sağlanmalıdır.
- Kanama, SNAP™ Terapi Sistemini sonlandırmak şekilde çalışmasını engelleyebileceği için antikoagülan veya platelet agregasyon inhibitörü kullanan hastalar için ekstra bakım ve izleme gerekir.
- Enfekte yaralar aşırı eksudatif ve daha az pansuman değişikliği gerektirebilir. Yeterli enfeksiyon ve hastalar/hasta bakıcılar yaraya, yara çevresindeki dokuya ve eksudaya enfeksiyon, enfeksiyonun kötüleşmesi veya diğer komplikasyon belirtilerine karşı dikkatli olmalıdır. Cerrahi girişler, kısmi/tam kalınlıklı yaralar, kanamalı yaralar veya çevresindeki alanda sıcaklık artışı, şişmiş alanlar, ağrı, kızarıklık, ödem, kötü kokulu akıntı, yara yatağında granülasyon dokusu olmaması, yara kenarları, kötüşük yok, septik şok veya/veya ölümcül yaralar gibi komplikasyonlara yol açabilir. Sistemik enfeksiyona yönelik bazı belirtiler bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, mukoz membranlarda veya cilt rengi değişiklikleri olarak kendini gösterebilir. Kemo bazlı tahliye göstergesinin yeşilden kırmızıya geçtiğini ve SNAP™ Terapi Sisteminin artık etkin olmadığını gösterir. Tıbi bölgesinde sistemik enfeksiyon belirtileri gösteren hastalarda sistemik antibiyotik tedavisi başlatılmalıdır.
- Kanama, SNAP™ Terapi Sistemini sonlandırmak şekilde çalışmasını engelleyebileceği için sistem kullanılmadan önce tam hemostazı sağlanmalıdır.
- Kanama, SNAP™ Terapi Sistemini sonlandırmak şekilde çalışmasını engelleyebileceği için antikoagülan veya platelet agregasyon inhibitörü kullanan hastalar için ekstra bakım ve izleme gerekir.
- Enfekte yaralar aşırı eksudatif ve daha az pansuman değişikliği gerektirebilir. Yeterli enfeksiyon ve hastalar/hasta bakıcılar yaraya, yara çevresindeki dokuya ve eksudaya enfeksiyon, enfeksiyonun kötüleşmesi veya diğer komplikasyon belirtilerine karşı dikkatli olmalıdır. Cerrahi girişler, kısmi/tam kalınlıklı yaralar, kanamalı yaralar veya çevresindeki alanda sıcaklık artışı, şişmiş alanlar, ağrı, kızarıklık, ödem, kötü kokulu akıntı, yara yatağında granülasyon dokusu olmaması, yara kenarları, kötüşük yok, septik şok veya/veya ölümcül yaralar gibi komplikasyonlara yol açabilir. Sistemik enfeksiyona yönelik bazı belirtiler bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, mukoz membranlarda veya cilt rengi değişiklikleri olarak kendini gösterebilir. Kemo bazlı tahliye göstergesinin yeşilden kırmızıya geçtiğini ve SNAP™ Terapi Sisteminin artık etkin olmadığını gösterir. Tıbi bölgesinde sistemik enfeksiyon belirtileri gösteren hastalarda sistemik antibiyotik tedavisi başlatılmalıdır.

ÖNLEMLER

- SNAP™ Terapi Sistemi reçete edilirken hastanın boyu ve kilosu dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır.
- Taklına de düşme riskini önlemek için SNAP™ Terapi Kartuşunun ve pansuman hortumunun düzgün şekilde konumlandırıldığından emin olun.
- Kan yoluyla bulaşan patojenlerin bulaşma riskini azaltmak için kuzum protokollere uygun olarak tüm hastalarda standart enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır.
- SNAP™ Terapi Sistemi, tedaviye uygunlu olmayan veya tedaviye karşı cihan hastaların tedavisinde kullanma uygun olmayabilir.
- Hastalar SNAP™ Terapi Sistemi tekniğiyle ilgili olabilir veya beyaz yapabilir. Bunyo sırasında SNAP™ Terapi Sistemini suya batırmayın.
- SNAP™ Terapi Kartuşu ve Askısı steril olarak sağlanmaz ve sterilize edilmemelidir.
- SNAP™ Terapi Kartuşu ve Pansumanı yalnızca oda sıcaklığında saklanmalıdır ve aşırı soğuğa ya da sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ (HBO)

Sistemin her hiperbarik oksijen (HBO) odasına girişinden önce çıkarılmalıdır ve bu tarz bir kullanımın yangın tehlikesi teşkil edebileceği kabul edildiğinden SNAP™ Terapi Kartuşunu, SNAP™ Askısını veya horum bağlantı parçasını asla hiperbarik oksijen odasına sokmayın. Pansumanın bağlantı parçasından sıyrılmasını önlemek için yara sonrası pansuman hortumunun açık ucunu pansaklı gazlı bezle kapatın. Alternatif olarak, SNAP™ Pansuman hiperbarik tedavi sırasında HBO ile uyumlu bir materyale değiştirilebilmesi.

DİKKAT: *HBO tedavisi sırasında horumu ÇIKARMAYIN.*

SNAP™ TERAPİ KARTUŞUNU SIFIRLAMA

SNAP™ Terapi Kartuşu klinik kullanım için gerektiği zaman ve ayrıca HBO tedavisi sonrasında bu talimatlara uygun olarak sıfırlanabilir.

Hava geçirmezlik sağlanmasından SNAP™ Terapi Kartuşu geri çekilmiş konuma gelir ve kırmızı basınç tahliye Göstergesi görünüşe aşağıdaki adımları izleyerek SNAP™ Terapi Kartuşunu sıfırlayın.



1. Serbest bırakma düğmesine basıp horum bağlantı parçasını SNAP™ Terapi Kartuşundan dışarıya doğru çekerek horum bağlantı parçasını çıkarın (**Şek. 13**). Hortumu horum bağlantı parçasından çıkarmayın.
2. SNAP™ Terapi Kartuşunun içinde eksuda veya jel halindeki BIOLOCK™ Teknolojisi materyali mevcutsa uygun klorür çözeltisi dağıtın gazlı bezle kapatın. SNAP™ Terapi Kartuşunu sıfırlarken her zaman
3. Etiketlerinizi/sıfırlama anahtarını SNAP™ Terapi Kartuşunun ucundaki yuvaya yerleştirin ve kapasite göstergesi SNAP™ Terapi Kartuşu penceresinde görünene kadar anahtarı dışarıya doğru çekin (**Şek. 14**).
4. SNAP™ Terapi Kartuşunu emilen bağlantıya için Adım 9'dan itibaren talimatlara **Sistem Uygulama Talimatları** bölümü'nden bakın.

Aşağıdaki durumlar yarada Hava Geçirmezlik özelliğinin sağlandığını gösterir:

- Yeşil kapasite göstergesi hazne penceresinde görünüyorsa ve sabitse.
- Pansuman vakumlanmış gibi görünüyorsa.
- Pansuman dokunduğunda sert hissediliyorsa.

SNAP™ Terapi Kartuşu sıfırlandıktan sonra bir sonun ortaya çıkana **Sorun Giderme** bölümüne bakın.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası Neden	Olası Çözüm
Yara pansumanında hava geçirmezlik sağlanmıyor ve kırmızı basınç tahliye göstergesi görünüyor. VEYA Yeşil kapasite göstergesi hazne penceresinde sabit şekilde kalmıyor.	• Hortum bağlantıları sıkı şekilde bağlanmamış olabilir. • Hidrokolloid de deri çevresindeki ara katmanda sızıntı olabilir.	• Hortum bağlantılarının sıkı şekilde bağlanmasını sağlayın. • Pansumanı pansumanda düzleştirerek kenarlıkları düzeltin. • Bk 3M™ Tegaderm™ Şeffaf Pansuman Kenarlarında Sızıntıların Önlenmesi Talimatları'nda yer alan pansumanla sızdırmazlığı sağlamak için pansuman kenarına SNAP™ Securing™ Hidrokolloid uygulayın.
Yarada hava geçirmezlik sağlanmamış ve yeşil kapasite göstergesi sabit.	• Hortum tıkalı olabilir. • Pansumanda oklüzyon olabilir.	• Hortumda tıkanıklık veya bükülme varsa hortumu düzeltin veya SNAP™ Terapi Pansumanını değiştirin. • Yara pansumanında oklüzyon olabilir. Pansumanları değiştirin.

1. Yara yatağını ve yara çevresindeki deriyi kuru pansuman protokolüne uygun olarak hazırlayın ve yara yatağının nemli salinle iyice yıkayın (**Şek. 1**).
2. Sizi boyunca yara için gerek görülmesi halinde yara çevresindeki deriye bir deri koruyucu uygulayın (**Şek. 2**).
3. Açık pansuman ilgili olarak, sizi konuşu yara için gerek görülmesi halinde yaranın boyutuna göre geniş meçil ve yaşpkan olmayan tek katmanlı bir parça kesip yara yatağının üzerine yerleştirin (**Şek. 3**). Kesilmiş ara katmanın yaranın kenarlarının dışına uzandığından emin olun.
4. Köpük ara katmanı yaranın boyutuna ve şekline uygun olarak kesin (**Şek. 4**).

NOT: *Gerçekleşmiş yara içine düşmesini önlemek için köpüğü doğrudan yara yatağının üzerine koymayın. Kesme işleminden sonra köpüğün kenarlarının fiziksel olarak parçalan temizleyin.*

TEMİZLEME

SNAP™ Terapi Sistemi kirlenirse aşağıdaki genel yönergeleri izleyin:

- Nemli bir yumuşak bezle temizleyin.
- Kuru bir bezi kullanarak kurulayın.
- Kimyasal veya aşındırıcı kimyasallar kullanmayın.

DİKKAT: *SNAP™ Terapi Sistemi sıvı içine batırmayın.*

KULLANILAN SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

DİKKAT: Federal (ABD) yasa uyarınca bu cihaz, sadece bir doktor tarafından veya doktor siparişiyle satılabilir/ kiralanabilir







PANSUMANI UYGULAMA VE SNAP™ TERAPİ KARTUŞUNU ETKİNLEŞTİRME TALİMATLARI

Her yara benzersizdir. Yarayı tedavi eden klinisyen yarayı özel bir değerlendirmeye bulunarak en uygun pansuman ve uygulama talimatlarını belirlemelidir.

UYARI: Kullanmadan önce tüm ambalajı kontrol edin ve ambalajı açık veya hasarlı olan ürünleri kullanmayın.

Aşağıdaki pansuman malzemelerinin bulunduğundan emin olun:

- Köpük Ara Katman
- SNAP™ Uzun Pansuman
- Geniş meşil ve yapışkan olmayan pansuman (gerekirse)

SİSTEM UYGULAMA TALİMATLARI

1. Yara yatağını ve yara çevresindeki deriyi kuru pansuman protokolüne uygun olarak hazırlayın ve yara yatağının nemli salinle iyice yıkayın (**Şek. 1**).
2. Sizi boyunca yara için gerek görülmesi halinde yara çevresindeki deriye bir deri koruyucu uygulayın (**Şek. 2**).
3. Açık pansuman ilgili olarak, sizi konuşu yara için gerek görülmesi halinde yaranın boyutuna göre geniş meçil ve yaşpkan olmayan tek katmanlı bir parça kesip yara yatağının üzerine yerleştirin (**Şek. 3**). Kesilmiş ara katmanın yaranın kenarlarının dışına uzandığından emin olun. Sızdırmazlığın korunabilmesini için yara çevresinde en az 1 cm'lik sağlam derinin pansumana yapışığından emin olun.
4. Köpük ara katmanı yaranın boyutuna ve şekline uygun olarak kesin (**Şek. 4**).

NOT: *Gerçekleşmiş yara içine düşmesini önlemek için köpüğü doğrudan yara yatağının üzerine koymayın. Kesme işleminden sonra köpüğün kenarlarının fiziksel olarak parçalan temizleyin.*

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER

Ürün	Test Edilen Mikroorganizmalar
SNAP™ Terapi Kartuşu	*Staphylococcus aureus* *Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli* *Klebsiella pneumoniae* *Enterobacter cloacae* *Proteus mirabilis* *Acinetobacter baumannii* *Enterococcus faecalis* *Candida albicans*

ÖNEMLİ BİLGİLER

- Bu ürün, bir hastalık veya yaralanmanın tedavisi veya önlenmesi için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu ürün, bir ilaç, biyolojik ürün veya cihaz içermemektedir.
- Bu ürün, bir hastalık veya yaralanmanın tedavisi veya önlenmesi için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu ürün, bir ilaç, biyolojik ürün veya cihaz içermemektedir.

DOKTOR TALİMATLARI

SNAP™ Terapi Kartuşunun, her biri önceden ayarlı bir negatif basınç seviyesi (-75, -100 ve -125 mmHg) oluşturabilecek üç farklı modeli mevcuttur. Belirli bir SNAP™ Terapi Sisteminin yerleştirilmesinden önce sistemi söz konusu yara için en uygun şekilde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmelisiniz.

Kullanım Endikasyonlarını karşılandığından emin olmak için yaranın ve hastanın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.

Şu genel kuralları uygulamalıdır:

- Negatif basınç seviyesi hiçbir zaman hastada acıya yol açacak düzeyde olmamalıdır. Hastanın belirli bir basınç seviyesinde rahatsızlık yaşadığını bildirmesi durumunda, hastanın cihaz kullanımından rahatsız olmadığı bir basınç seviyesine belirtmeyi daha düşük negatif basınçlı bir SNAP™ Terapi Kartuşu kullanılmalıdır.
- Hastanın ağrı seviyesini 1-10 arasında bir ölçekte değerlendirmesini isteyin.

Klinisyenin hasta bakıcılar veya diğer kullanıcılar talimatları şunları içermelidir:

- Kullanılacak negatif basınç seviyesi
- Pansuman değişim sıklığı
- Kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlar
- Hasta eğitimi ve kılavuz bilgiler
- Sistemin nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bilgi notları

Hasta ve/veya hasta bakıcıya kalıcı şekilde silinmez talimatların üzerinden geçin ve hastanın ve/veya hasta bakıcının bu talimatları anladığından emin olun. Gerekirse tekrar edin.

Hastanın ve/veya hasta bakıcının ayrıntılarının önce aşağıdaki husulan anladığından emin olun:

- SNAP™ Terapi Kartuşunun Kontrol Sıklığı (en az sekiz saatte bir)
- Kırmızı basınç tahliye göstergesi görünüyorsa ve SNAP™ Terapi Kartuşu dolu değilse SNAP™ Terapi Kartuşunu sıfırlayın.
- Kırmızı basınç tahliye göstergesi görünüyorsa ve SNAP™ Terapi Kartuşu dolu/BIOLOCK™ Jel ile doluysa SNAP™ Terapi Kartuşunu değiştirin.
- Pansuman değişimi gerektiğinde: **SNAP™ Terapi Kartuşunu Değiştirme** bölümüne bakın.
- Hidrokolloid pansuman değişimi gerektiğinde: **Sistem Uygulama Talimatları** bölümüne bakın.
- Pansumanın ne zaman değiştirileceğine ilişkin bilgi için pansumanla değiştirilmesi gerektiği: **Sistem Uygulama Talimatları** bölümüne bakın.
- BIOLOCK™ Teknolojisi, SNAP™ Terapi Kartuşundaki eksudayi jel haline getirir.

TEMİZLEME

SNAP™ Terapi Sistemi kirlenirse aşağıdaki genel yönergeleri izleyin:

- Nemli bir yumuşak bezle temizleyin.
- Kuru bir bezi kullanarak kurulayın.
- Kimyasal veya aşındırıcı kimyasallar kullanmayın.

DİKKAT: *SNAP™ Terapi Sistemi sıvı içine batırmayın.*

KULLANILAN SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

DİKKAT: Federal (ABD) yasa uyarınca bu cihaz, sadece bir doktor tarafından veya doktor siparişiyle satılabilir/ kiralanabilir

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER

Ürün	Test Edilen Mikroorganizmalar
SNAP™ Terapi Kartuşu	*Staphylococcus aureus* *Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli* *Klebsiella pneumoniae* *Enterobacter cloacae* *Proteus mirabilis* *Acinetobacter baumannii* *Enterococcus faecalis* *Candida albicans*

ÖNEMLİ BİLGİLER

- Bu ürün, bir hastalık veya yaralanmanın tedavisi veya önlenmesi için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu ürün, bir ilaç, biyolojik ürün veya cihaz içermemektedir.
- Bu ürün, bir hastalık veya yaralanmanın tedavisi veya önlenmesi için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu ürün, bir ilaç, biyolojik ürün veya cihaz içermemektedir.

DOKTOR TALİMATLARI

SNAP™ Terapi Kartuşunun, her biri önceden ayarlı bir negatif basınç seviyesi (-75, -100 ve -125 mmHg) oluşturabilecek üç farklı modeli mevcuttur. Belirli bir SNAP™ Terapi Sisteminin yerleştirilmesinden önce sistemi söz konusu yara için en uygun şekilde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmelisiniz.

Kullanım Endikasyonlarını karşılandığından emin olmak için yaranın ve hastanın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.

Şu genel kuralları uygulamalıdır:

- Negatif basınç seviyesi hiçbir zaman hastada acıya yol açacak düzeyde olmamalıdır. Hastanın belirli bir basınç seviyesinde rahatsızlık yaşadığını bildirmesi durumunda, hastanın cihaz kullanımından rahatsız olmadığı bir basınç seviyesine belirtmeyi daha düşük negatif basınçlı bir SNAP™ Terapi Kartuşu kullanılmalıdır.
- Hastanın ağrı seviyesini 1-10 arasında bir ölçekte değerlendirmesini isteyin.

Klinisyenin hasta bakıcılar veya diğer kullanıcılar talimatları şunları içermelidir:

- Kullanılacak negatif basınç seviyesi
- Pansuman değişim sıklığı
- Kullanıcıların karşılaşabileceği sorunlar
- Hasta eğitimi ve kılavuz bilgiler
- Sistemin nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bilgi notları

Hasta ve/veya hasta bakıcıya kalıcı şekilde silinmez talimatların üzerinden geçin ve hastanın ve/veya hasta bakıcının bu talimatları anladığından emin olun. Gerekirse tekrar edin.

Hastanın ve/veya hasta bakıcının ayrıntılarının önce aşağıdaki husulan anladığından emin olun:

- SNAP™ Terapi Kartuşunun Kontrol Sıklığı (en az sekiz saatte bir)
- Kırmızı basınç tahliye göstergesi görünüyorsa ve SNAP™ Terapi Kartuşu dolu değilse SNAP™ Terapi Kartuşunu sıfırlayın.
- Kırmızı basınç tahliye göstergesi görünüyorsa ve SNAP™ Terapi Kartuşu dolu/BIOLOCK™ Jel ile doluysa SNAP™ Terapi Kartuşunu değiştirin.
- Pansuman değişimi gerektiğinde: **SNAP™ Terapi Kartuşunu Değiştirme** bölümüne bakın.
- Hidrokolloid pansuman değişimi gerektiğinde: **Sistem Uygulama Talimatları** bölümüne bakın.
- Pansumanın ne zaman değiştirileceğine ilişkin bilgi için pansum

KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
www.acelity.com

KCI Manufacturing
Unlimited Company
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone,
Co. Westmeath, Ireland
www.kci-medical.com

SNAP™-BEHANDLINGSSYSTEM

BRUKSANVISNING

SNAP™-behandlingspatron
SNAP™ lang forbinding-sett
SNAP™-behandlingsstropp

NORSK

FOAM

SYSTEMBESKRIVELSE

SNAP™-behandlingssystemet inkluderer en mekanisk drevet engangsenhet for påføring av undertrykk samt et forbindingssett for medisinsk bruk.

Ikke laget med naturgummilateks.

FUNKSJONER I SNAP™-BEHANDLINGSSYSTEMET



SNAP™-behandlingspatron



INDIKASJONER FOR BRUK

SNAP™-behandlingssystemet er ment for pasienter som vil dra nytte av sårbehandling via bruk av undertrykk, spesielt fordi enheten kan fremme legingen av sår ved å fjerne overflødig eksudat, infeksiøst materiale og vevsrester. SNAP™-behandlingssystemet er beregnet for fjerning av små mengder eksudat fra kroniske, akutte, traumatiske, subakutte eller gjenåpnede sår, magesår (for eksempel diabetessår, venøs eller trykk), lukkede kirurgiske inngrep, vevsfliker og transplantert vev.

KONTRAINDIKASJONER

Ikke plasser SNAP™-behandlingssystemet over

- sår som ikke fullstendig drenert
- nekrotisk vev, som sårskorpe eller dødt vev som henger fast
- eksponerte blodårer, anastomoseområder, organer, tendoner eller nerver
- ondartede sår
- fistler
- ubehandlet osteomyelitt
- sår med aktiv blødning

ADVARSLER

- En betingelse for bruk er at enheten benyttes under overvåking av kvalifisert helsepersonell, og at brukeren har den nødvendige opplæringen i og kunnskapen om det spesifikke medisinske bruksområde som SNAP™-behandlingssystemet benyttes til. Hvis ikke disse betingelsene følges og/eller alle instruksjonene for bruk av behandlingsapparatet og påføring av forbinding samt sikkerhetsinformasjonen leses nøye og følges før hver gangs bruk, kan det føre til feilfunksjon på produktet og potensiell alvorlig skade eller død.
- SNAP™-behandlingssystemet er ikke studert på pediatripasienter.
- Bare til bruk på én pasient. Ikke bruk på nytt, behandle på nytt eller steriliser på nytt. Gjenbruk, ny behandling eller ny sterilisering vil redusere den strukturelle integriteten i enheten og/eller føre til enhetsfeil, som igjen kan føre til skade eller sykdom hos pasienten.
- Ikke bruk forbindingen på pasienter som er allergiske mot hydrokolloide klebemidler eller polyuretanfilm.
- Ikke bruk kompresjon på eksudat eller fortykket BIOLOCK™-materiale i såret når du tilbakestiller SNAP™-behandlingspatronen, slik at du unngår utblåsing av eksudat eller BIOLOCK™-materiale.
- La aldri SNAP™ lang forbinding være på uten bruk av aktivt undertrykk, med mindre pasienten er under klinisk overvåking. Hvis den røde indikatoren for trykkutslipp vises, er ikke undertrykk lenger aktivt.
- Fullstendig hemostase må oppnås før systemet tas i bruk, fordi blødninger kan forstyrre den normale funksjonen i SNAP™-behandlingssystemet.
- Ekstra pleie og overvåking er nødvendig for pasienter som er på antikoagulanter eller hemmere av plateaggregering, fordi blødninger kan forstyrre den normale funksjonen i SNAP™-behandlingssystemet.
- Infiserte sår må overvåkes nøye og krever kanskje hyppigere bytte av forbinding. Helsepersonell og pasienter/pleiere må hyppig overvåke såret, vevet rundt såret og eksudat for tegn på infeksjon, forverring av infeksjon eller andre komplikasjoner. Noen tegn på infeksjon er feber, ømhet, rødhet, oppsvulming, kløe, utslett, økt varme i såret eller området rundt såret, pussflyt utsondring eller sterk lukt. Infeksjon kan være alvorlig og kan føre til komplikasjoner som smerte, ubehag, feber, koldbrann, toksisk sjokk, septisk sjokk og/eller livstruende skade. Noen tegn på systemisk infeksjon er kvalme, oppkast, diaré, hodepine, svimmelhet, besvimelse, sår hals med oppsvulming av slimhinnene, forvirring, høy feber, refraktær og/eller ortostatisk hypotensjon eller erytrodermi (et solbrentlignende utslett). Hvis det foreligger noen tegn på begynnende systemisk infeksjon eller utvikling av infeksjon i sårområdet, må du umiddelbart kontakte en lege for å avgjøre om behandlingen skal avbrytes.
- Vær forsiktig ved bruk av SNAP™-behandlingssystemet på pasienter med ryggmargsskade. Stimulus fra plassering, start eller opphør av undertrykk kan føre til autonom dysrefleksi. Hvis en pasient som bruker SNAP™-behandlingssystemet, opplever autonom dysrefleksi, må bruk av systemet avbrytes og lege kontaktes.
- Forbindingen må fjernes før defibrillering hvis den er i nærheten av plasseringen av putene/elektrodene.
- Svært eksuderende sår kan føre til væsketap og tap av elektrolytter. I slike tilfeller kan det være viktig å følge nøye med på elektrolyttene.
- Pasienter med alvorlig underernæring kan ha større risiko for væsketap fra sårene og må kanskje sjekkes hyppigere.
- For å unngå iskemi må forbindingen ikke plasseres heldekkende rundt utvekster, og SNAP™-behandlingsstroppen må sitte så løst som mulig.
- Avhend hvis pakken er åpen eller skadet.
- Ikke plasser forbindingsmaterialene i blinde og utforskede ganger.
- Grenseflaten på skumputen må ikke være i direkte kontakt med skjøre strukturer som tendoner, leddbånd og nerver. Det bør brukes vidmaskede, ikke-klebende strukturer for biologisk utviklet vev eller naturlig vev for å dekke og beskytte skjøre strukturer.
- Under den første plasseringen av grenseflaten på skumputen må du telle det totale antallet deler som plasseres i såret, og dokumentere dette tallet i henhold til institusjonens retningslinjer.
- Når forbindingen fjernes, må du kontrollere at alle delene, slik de ble dokumentert under den første plasseringen, og eventuelle fragmenter fjernes fra såret. Hvis forbindingsmateriale utilsiktet blir liggende i såret over lengre perioder enn det som er anbefalt, kan det føre til infeksjon eller andre skader.
- For åpne sår anbefales det at forbindingen byttes minst to ganger per uke, og at SNAP™-behandlingspatronen byttes minst én gang per uke. Hyppigheten justeres av helsepersonellet etter behov. For lukkede snitt kan forbindingen bli sittende på for kontinuerlig bruk i opptil sju dager.
- Helsepersonell, pleiere og pasienter må overvåke pasientens sår, det omsluttende vevet og utsondret eksudat nøye for tegn på infeksjon eller andre sekundære tilstander, for eksempel maserasjon eller vevsnekrose. Infeksjoner kan være alvorlige og føre til septisk eller toksisk sjokk og/eller dødsfall.
- SNAP™-behandlingspatronen er ikke trygg for bruk med MR-utstyr (magnetresonanstomografi). Ikke bruk den i et MR-rom.
- Skarpe kanter som benfragmenter må fjernes fra sårbehandlingsområdet før du plasserer SNAP™ lang forbinding på grunn av risiko for at det går hull på forbindingen, noe som vil redusere riktig funksjon av SNAP™-behandlingssystemet. Det kan også gå hull på blodårer eller organer, noe som kan gi skader.
- Ikke plasser SNAP™-behandlingssystemet på vagusnerven, da dette kan forårsake bradykardi.
- Ikke plasser SNAP™-behandlingssystemet på sprø årer eller infiserte blodårer. Infiserte eller svekkede årer er mer utsatt for skader, noe som kan gi blødninger som forstyrrer funksjonen i systemet.

FORHOLDSREGLER

- Pasientens størrelse og vekt må vurderes nøye ved foreskriving av SNAP™-behandlingssystemet.
- SNAP™-behandlingspatronen og forbindingsslangen må plasseres nøye og nøyaktig for å forhindre risiko for å snuble og falle.
- Ta alminnelige forholdsregler for infeksjonskontroll med alle pasienter i henhold til institusjonens retningslinjer for å redusere risikoen for overføring av blodbårne patogener.
- SNAP™-behandlingssystemet er kanskje ikke egnet for behandling av pasienter som ikke godtar det eller kjemper imot.
- Pasienter kan dusje eller bade med SNAP™-behandlingssystemet på seg. Ved bading må SNAP™-behandlingssystemet ikke senkes under vann.
- SNAP™-behandlingspatronen og -stroppen er ikke-sterile og skal ikke steriliseres.
- SNAP™-behandlingspatronen og -forbindingen må bare oppbevares i romtemperatur og må ikke eksponeres for ekstrem kulde eller varme.

HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (HBOT)

Ikke ta med SNAP™-behandlingspatronen, SNAP™-stroppen eller slangekoblingen inn i et kammer for hyperbar oksygenbehandling (HBOT), ettersom de ikke er studert for bruk i dette miljøet og kan utgjøre brannfare. Når forbindingsslangen er koblet fra slangekoblingen, dekker du til den åpne enden av forbindingsslangen med bomullsgasbind. Du kan også bytte ut SNAP™-forbindingen med et annet HBOT-kompatibelt materiale under den hyperbare behandlingen.

OBS! *Ikke klem sammen slangen under HBOT-behandling.*

GARANTIFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV RETTSMIDDEL

KCI FRASKRIVER SEG HERVED ALLE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EN EVENTUELL UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL KCI-PRODUKTET/-PRODUKTENE SOM BESKRIVES I DENNE PUBLIKASJONEN. EN EVENTUELL SKRIFTLIG GARANTI KCI GIR, SKAL VÆRE UTTRYKKELIG FREMSATT I DENNE PUBLIKASJONEN ELLER LEVERT SAMMEN MED PRODUKTET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL KCI VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESMESSIGE SKADER OG UTGIFTER, INKLUDERT MATERIELLE SKADER OG PERSONSKADER, SOM HELT ELLER DELVIS SKYLDES BRUK AV PRODUKTET, MED UNNTAK AV SKADER SOM GJELDENDE LOV UTTRYKKELIG FORBYR FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR ELLER BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR FOR. INGEN KAN BINDE KCI TIL NOEN SOM HELST FREMSTILLING ELLER GARANTI, UNNTATT SLIK DET ER SPESIFIKT FREMSATT I DETTE AVSNITTET.

Beskrivelser eller spesifikasjoner i trykt KCI-materiell, inkludert denne publikasjonen, er bare ment som en generell beskrivelse av produktet på produksjonstidspunktet, og utgjør ingen uttrykkelige garantier, unntatt slik det er fremsatt i den skriftlige begrensede garantien som følger med dette produktet. Informasjonen i denne publikasjonen kan endres når som helst. Kontakt KCI for å få oppdateringer.

LEGENS INSTRUKSJONER

SNAP™-behandlingspatronen er tilgjengelig i tre modeller som alle er i stand til å skape et forhåndsdefinert undertrykksnivå (–75, –100 og –125 mmHg). Før SNAP™-behandlingssystemet plasseres, må helsepersonellet vurdere hvordan systemet kan brukes på en optimal måte for et individuelt sår.

Det er viktig å vurdere såret og pasienten nøye for å sikre at indikasjonene for bruk er overholdes.

Følg disse generelle retningslinjene:

- Undertrykksnivået skal aldri være smertefullt for pasienten. Hvis en pasient melder om ubehag ved et bestemt trykknivå, må SNAP™-behandlingspatronen brukes med lavere undertrykk til pasienten melder at det er komfortabelt å bruke enheten.
- Hvis pasienten melder ubehag med –75 mmHg-modellen, bør behandling med SNAP™-behandlingssystemet avbrytes.

Legens instruksjoner til helsepersonellet/pleieren må inneholde:

- hvilket undertrykknivå som skal benyttes
- hvor hyppig forbindingen skal byttes
- hvilke tilleggsforbindinger som skal brukes
- pasientopplæring og -veiledning
- ønsket varighet for behandlingen og/eller sluttidspunkt

Les gjennom instruksjonene på etiketten sammen med pasienten og/eller pleieren, og forsikre deg om at pasienten og/eller pleieren forstår dem.

Forsikre deg om at pasienten og/eller pleieren forstår følgende før bruk:

- Hyppigheten for inspeksjon av SNAP™-behandlingspatronen (minst hver åttende time).
- Tilbakestilling av SNAP™-behandlingspatronen når den røde indikatoren for trykkutslipp vises og SNAP™-behandlingspatronen ikke er full.
- Bytte av SNAP™-behandlingspatronen når den røde indikatoren for trykkutslipp vises og SNAP™-behandlingspatronen er full av eksudat / BIOLOCK™-gelé.
- Hvordan SNAP™-behandlingspatronen byttes. Se delen **Bytte SNAP™-behandlingspatronen**.
- Hvordan man oppdager en lekkasje i hydrokolloidet og hva man gjør for å takle det. Se delen **Feilsøking**.
- Når det er nødvendig å fjerne forbindingen helt og bytte den med en annen forbinding. Se delen **Instruksjoner for bruk av systemet**.
- BIOLOCK™-teknologi vil fortykke eksudat i SNAP™-behandlingspatronen.

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV SYSTEMET (FORTS.)

5. Plasser grenseflaten på skumputen i sårhulen (**fig. 5**). Grenseflaten på skumputen må fylle sårhulen og strekke seg ut over sårkantene. For lukkede snitt plasserer du grenseflaten over snittet.

   MERK: *Tell og registrer antallet deler som benyttes, for å sikre at det samme antallet deler fjernes når forbindingen fjernes. Hvis en bit av skumputen brukes i en gang, må du kontrollere at skumputen er i kontakt med skumputen i den primære sårbunnen. Ikke plasser skumputen i blinde eller uutforskede ganger.*

6. Plasser SNAP™ lang forbinding over såret, og forsegle den (**fig. 6**). Kontroller at den midterste åpningen på kontakten på forbindingen er plassert over grenseflaten på skumputen. Sørg for at minst 1 cm av frisk hud rundt såret er klebet til forbindingen, for å opprettholde en ordentlig forsegling.
7. Kutt forbindingsslangen i ønsket lengde (**fig. 7**).

   MERK: *Kuttet må være rett, og ikke vinklet (**fig. 8**). Dette gir riktig forsegling når slangen kobles til slangekoblingen.*

8. Sett slangekoblingen helt inn i slangen (**fig. 9**).

   OBS! *IKKE ta av hetten på enden av slangekoblingen.*



9. Koble SNAP™-behandlingspatronen til slangekoblingen med begge hendene (**fig. 10**).
10. Aktiver SNAP™-behandlingspatronen ved å trykke ned aktiverings-/tilbakestillingsknappen og dra den ut (**fig. 11**). Sett den så inn igjen og gjenta etter behov til en lufttett forsegling oppnås og den røde trykkutløsingsidikatoren ikke vises i trykkutløsingsvinduet.
11. Fest SNAP™-behandlingspatronen til pasientens arm/bein eller belte ved hjelp av SNAP™-behandlingsstroppen (**fig. 12**).

    MERK: *Når stroppen er plassert rundt en ekstremitet, må du forsikre deg om at stroppen ikke er plassert for tett, da dette kan føre til ubehag eller potensielt redusere blodstrømmen til ekstremiteten. Distal perfusjon kan vurderes ved å følge med på hudfarge, endret fornemmelse eller pulser.*

12. Kontroller at undertrykket fungerer. SNAP™-behandlingssystemet fungerer som det skal hvis:
    - Den grønne kapasitetsindikatoren både er synlig og stasjonær i kammervinduet.
    - Forbindingen ser "nedsunket" ut.
    - Forbindingen kjennes hard ut når du tar på den.

Regelmessig visuell inspeksjon av SNAP™-behandlingssystemet anbefales, slik at eventuelle tap i undertrykklevering kan oppdages i tide.

MERK: SNAP™-behandlingspatronen må undersøkes minst hver åttende time. *For åpne sår anbefales det at forbindingen byttes minst to ganger per uke. Helsepersonellet justerer hyppigheten etter behov. For lukkede snitt kan forbindingen bli sittende på i opptil sju dager.*

TILBAKESTILLE SNAP™-BEHANDLINGSPATRONEN

SNAP™-behandlingspatronen kan tilbakestilles etter behov i henhold til disse instruksjonene for klinisk bruk, inkludert tilbakestilling etter HBOT-behandling.

Hvis SNAP™-behandlingspatronen blir tilbaketrukket og den røde indikatoren for trykkutslipp vises før en lufttett forsegling er opprettet, må du tilbakestille SNAP™-behandlingspatronen ved å gjøre følgende:

1. Fjern slangekoblingen fra SNAP™-behandlingspatronen ved å trykke på utløserknappene og dra slangekoblingen ut av SNAP™-behandlingspatronen (**fig. 13**). Ikke fjern slangen fra slangekoblingen.
2. Dekk åpningen på SNAP™-behandlingspatronen med gasbind hvis det er eksudat eller fortykket BIOLOCK™-teknologimateriale i SNAP™-behandlingspatronen. Bruk alltid egnet personlig verneutstyr (PVU) når du tilbakestiller SNAP™-behandlingspatronen.
3. Sett inn aktiverings-/tilbakestillingsknappen i sporet på enden av SNAP™-behandlingspatronen, og skyv aktiverings-/tilbakestillingsknappen fremover i SNAP™-behandlingspatronen til kapasitetsindikatoren er 5 ml fra eventuelt eksudat eller BIOLOCK™-teknologimateriale i SNAP™-behandlingspatronen (**fig. 14**).

ADVARSEL: Ikke bruk kompresjon på eksudat eller fortykket BIOLOCK™-materiale i såret når du tilbakestiller SNAP™-behandlingspatronen, slik at du unngår utblåsing av eksudat eller BIOLOCK™-materiale. Dette må behandles som biomedisinsk avfall og avhendes i henhold til institusjonens retningslinjer.

4. Se instruksjonene fra trinn 9 (delen **Instruksjoner for bruk av systemet**) for å koble til SNAP™-behandlingspatronen på nytt.

Lufttett forsegling er oppnådd på såret hvis:

- Den grønne kapasitetsindikatoren både er synlig og stasjonær i kammervinduet.
- Forbindingen ser nedsunket ut.
- Forbindingen kjennes hard ut når du tar på den.

Hvis et problem vedvarer etter at du har tilbakestilt SNAP™-behandlingspatronen, kan du se delen **Feilsøking**.

BYTTE SNAP™-BEHANDLINGSPATRONEN

Hvis den røde indikatoren for trykkutslipp vises og SNAP™-behandlingspatronen er full, har ikke lenger SNAP™-behandlingspatronen funksjon for tilføring av undertrykk og må byttes med en ny SNAP™-behandlingspatron i henhold til trinnene nedenfor, hvis videre eller fortsatt behandling med SNAP™-behandlingssystemet er ønskelig eller foreskrevet av en lege.

1. Fjern slangekoblingen fra SNAP™-behandlingspatronen ved å trykke på utløserknappene og dra slangekoblingen ut av SNAP™-behandlingspatronen (**fig. 15**).

OBS! *IKKE ta av hetten på enden av slangekoblingen.*

2. Koble en ny SNAP™-behandlingspatron til slangekoblingen med begge hendene (**fig. 16**). Du hører et klikk når koblingen er på plass.
3. Aktiver SNAP™-behandlingspatronen som beskrevet i delen **Instruksjoner for bruk av systemet** (trinn 10). Avhend den brukte SNAP™-behandlingspatronen i henhold til institusjonens retningslinjer.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Lufttett forsegling er ikke på plass på sårforbindingen, og den røde indikatoren for trykkutslipp **VISES**. ELLER Den grønne kapasitetsindikatoren er ikke stasjonær i kammervinduet.	• Slangetilkoblingene er kanskje ikke godt nok festet. • Det kan være en lekkasje i grenseflaten mellom hydrokolloidet og huden.	• Kontroller at slangetilkoblingene sitter godt fast. • Glatt ut eventuelle rynker på forbindingen med fingrene. • Forsegle forbindingskantene med ekstra 3M™ Tegaderm™-forbinding. • Påfør SNAP™ SecurRing™-hydrokolloid på forbindingskanten for å forsegle vanskelige anatomiske steder.
Lufttett forsegling er ikke på plass på såret, og den grønne kapasitetsindikatoren er stasjonær.	• Det kan være okklusjon i slangen. • Det kan være okklusjon i forbindingen.	• Undersøk slangen for mulig okklusjon eller knekk, og rett eventuelt ut slangen eller bytt ut SNAP™-behandlingsforseglingen. • Det kan være okklusjon i sårforbindingen. Bytt ut sårforbindingen.

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV FORBINDING OG AKTIVERING AV SNAP™-BEHANDLINGSPATRONER

Alle sår er unike. Helsepersonellet som behandler såret, må foreta en individuell vurdering av hva som vil være en optimal forbindings- og påføringsmetode.

ADVARSEL: Undersøk all emballasje før bruk, og ikke bruk produkter fra pakker som er åpne eller skadet.

Kontroller at du har følgende forbindingselementer:

- grenseflate på skumpute
- SNAP™ lang forbinding
- vidmasket, ikke-klebende forbinding (hvis nødvendig)

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV SYSTEMET



1. Klargjør sårbunnen og huden rundt såret i henhold til institusjonens retningslinjer, og skyll sårbunnen grundig med vanlig saltvannsløsning (**fig. 1**).
2. Hvis det er nødvendig for det spesifikke såret, bruker du hudbeskyttelse på huden rundt (**fig. 2**).
3. Hvis det ved åpne sår er nødvendig for et bestemt sår, klipper du ut ett lag av den vidmaskede, ikke-klebende forbindingen av samme størrelse som såret, og plasserer det på sårbunnen. For lukkede snitt plasserer du ett lag med vidmasket, ikke-klebende forbinding over snittets lengde (**fig. 3**).
4. Klipp skumoverflaten slik at den passer til størrelsen og formen av såret (**fig. 4**).

   MERK: *Ikke klipp til skummet rett over sårbunnen, da løse fragmenter kan falle ned i såret. Børst av skumkanter etter klipping for å fjerne alle løse fragmenter.*

RENGJØRING

Hvis SNAP™-behandlingssystemet blir skittent, kan du følge de generelle retningslinjene nedenfor:

- Rengjør med en fuktig, myk klut.
- Tørk med en tørr klut.
- Unngå bruk av korroderende eller slipende kjemikalier.

OBS! *Ikke senk SNAP™-behandlingssystemet i væske.*

SYMBOLFORKLARING

	Se bruksanvisning		Produsent		Produksjonsdato
	Kun til engangsbruk		Brukes innen	REF	Katalognummer
	Skal ikke brukes hvis pakken er skadet eller åpnet		Må holdes tørt	Do Not Resterilize	Ikke steriliser på nytt
NON STERILE	Ikke-steril	LOT	Lotnummer	Rx Only	**OBS!** I tråd med føderal lovgivning (USA) kan dette utstyret bare selges / leies ut av eller forordnes av en lege
	For bruk for én pasient	MR	Ikke MR-sikkert		
STERILE R	Steriliseringsmetode – stråling				
EC REP	Autorisert representant i EU				

3M™ Tegaderm™ er et varemerke tilhørende selskapet 3M™. Med mindre noe annet er spesifikt angitt i teksten, tilhører alle andre varemerker som er nevnt her, KCI Licensing, Inc., deres datterselskaper og/eller lisensgivere. Opphavsrett 2018 KCI Licensing, Inc. Med enerett. 418642 Rev B 9/2018